

# ដំណាំប្រេង

## ការរៀបចំដីដាំ

រៀបចំរងទំហំ១ម៉ែត្រ (ត្រូវមានកំពស់ ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ ប្រយ័ត្នតិចនៅរដូវវស្សា) ពង្រាយដីលាមកគោស្នូតរឹកប៉ុស្តិ៍ និង ដីកែងៗពេញរងហើយកាប់ប្រចល់ជាមួយដីអោយសព្វល្អគ្រប រងដោយគំរបដីផ្លាស់ស្លឹក រឺ ចំបើងអោយបានកំរាស់យ៉ាងតិច៥ សង់ទីម៉ែត្រដើម្បីការពារស្មៅចង្រៃ និងរក្សាសំណើមដី។



ការបង្កើនទឹកចូលធ្វើឲ្យដីមានសំណើម

## ការបណ្តុះគ្រាប់

គ្រាប់គ្រាប់ក្នុងទឹកក្តៅ១០០០ រយៈពេលពី ១៥ ទៅ ២០ នាទី (រដូវក្តៅអាចដាក់គ្រាប់បណ្តុះតែម្តងបាន) ពង្រាយគ្រាប់ ដែលបានគ្រាប់ហើយលើក្រណាត់សើមហើយដក់ទឹក មូកក្រណាត់ នេះរួចយកទុកក្នុងកន្លែងងងឹតត្រូវរក្សាក្រណាត់ដែលបានមូរឲ្យ មានសំណើម តែមិនត្រូវអោយសើមពេកទេបន្ទាប់ពីផ្តាប់២ថ្ងៃ គ្រាប់នឹងបែកមាត់ នោះយើងអាចយកគ្រាប់នេះទៅដាក់បណ្តុះ ក្នុងកន្លែង រឺថាសបណ្តុះបាន។

## ការបណ្តុះកូន

រៀបចំកន្លែងបណ្តុះ (ស្លឹកត្នោត រឺស្លឹកចេក) រឺ ថាស បណ្តុះ យកដីមានជីជាតិ(ដីដំបូក)១ភាគ ដីកំប៉ុស្តិ៍រឺដីលាមក គោដែលល្អៗ១ភាគ និងដេអង្កាម១ ភាគ លាយជាមួយគ្នា ហើយ យកទៅលឹងអោយក្តៅបំផុត រួចទុកអោយត្រជាក់ទើប ដាក់កន្លែង។ បណ្តុះតែ១គ្រាប់ក្នុងមួយកន្លែង ត្រូវគ្របសំណាញ់ សត្វល្អិត និងធ្វើដំបូលគ្របប្រអប់ស្លឹកដូងឬសំណាញ់កាត់ត្រីនៅ រដូវក្តៅ។ រដូវវស្សាត្រូវធ្វើដំបូលការពារទឹកភ្លៀង ពីព្រោះកូន ដំណាំនៅតូចមិនត្រូវការពន្លឺ និងទឹកច្រើនទេ។ ស្រោចទឹក១ថ្ងៃ មួយដងនៅពេលព្រឹក (បើទុកដីបណ្តុះស្ងួត គ្រាប់មិនអាចដុះ បានទេ បើកូនដុះហើយក៏នៅក្រិនដែរ)



## ការដាំកូនប្រេង

កូនអាយុបាន ៧ថ្ងៃ អាចយកទៅដាំបាន ត្រូវដាក់កូន ប្រេងអោយត្រូវចំពន្លឺថ្ងៃបានចំនួន២-៣ថ្ងៃមុនដាំដើម្បីអោយកូន រឹងមាំល្អហើយផ្សំនិងអាកាសធាតុខាងក្រៅបានស្រោចទឹកកូន ប្រេងឲ្យសើមល្អនៅពេលព្រឹក ហើយចាប់ផ្តើមដាំកូនប្រេងនៅ ពេលរសៀលយកកូនចេញពីកន្លែង រឺថាសបណ្តុះដោយប្រុង ប្រយ័ត្នបំផុត មិនត្រូវអោយដាច់ឬសកូនប្រេងឡើយត្រូវដឹងថាកូន ប្រេងត្រូវការស្រោចទឹកអោយបានគ្រប់គ្រាន់ ជាពិសេសរវាងពី ២ -៣ អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំកូនហើយត្រូវដោតទ្រើងភ្លាមបន្ទាប់ពីដាំ ពីព្រោះប្រេងដុះលូតលាស់លឿនណាស់ បើទុកអោយវាធំទើបដោត ទ្រើងធ្វើអោយដាច់ឬសដំណាំ



## ការថែទាំ

គួរកាត់ស្លឹកដែលនៅក្បែរដីចេញ និងកាត់ខ្លែងទាំងឡាយ ណាដែលនៅកំពស់ពីដីកន្លះម៉ែត្រចុះមកក្រោមត្រូវស្រោចទឹក

ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹក ជៀសវាងស្រោចទឹកច្រើនពេក ធ្វើឲ្យដីសើមជ្រុលនៅពេលថ្ងៃល្ងាច វាអាចបង្កអោយមានបញ្ហា ដល់ ដំណាំបាន។



**ការប្រើប្រាស់ដី ១៥០.៩០.១៣០ (បើដាក់ដីត្រូវស្រោចទឹក ទើបដំណាំអាចចាប់យកជីបាន)**

ពេលវេលា	ប្រភេទដី/ខណ្ឌ	កន្លែងដែលត្រូវដាក់ដី
មុនដាំ	ដីលាមកសត្វ ១.៥ គីឡូក្រាម ដី អិន ប៉េ កា (១៥.១៥.១៥) ១ស្លាបព្រាបាយកំពុង (១៥ក្រាម)	ពង្រាយលើរង
ការដាំកូន	តែមួយដើម ក្នុងមួយរណ្តៅ	
២អាទិត្យបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥) ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១០ក្រាម) ដីអ៊ុយរ៉េ ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១០ក្រាម)	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់កន្លះតឹក
៤អាទិត្យបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥) ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១០ក្រាម ដីអ៊ុយរ៉េ ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១០ក្រាម)	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹក
៦ អាទិត្យបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥) ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១០ក្រាម) ដីប៉ូតាស្យូម កន្លះស្លាបព្រាបាយ	កប់ដីរាក់ៗ
៨អាទិត្យបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥) ១ស្លាបព្រាបាយស្មើ (១៥ក្រាម) ដីប៉ូតាស្យូម កន្លះស្លាបព្រាបាយ (៥ក្រាម)	កប់ដីរាក់ៗ ចំងាយពីគល់១តឹកកន្លះ
១០អាទិត្យបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥) បាយកំពុង (១៥ក្រាម)	កប់ដីរាក់ៗចំងាយពីគល់១តឹកកន្លះ
១២អាទិត្យបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉េ កា (១៥. ១៥.១៥) ១ស្លាបព្រាបាយកំពុង (១៥ក្រាម)	កប់ដីរាក់ៗចំងាយពីគល់១តឹកកន្លះ

**ការការពារជំងឺនិងសត្វល្អិត**

**រុយចោះផ្លែ:**

ត្រូវខ្ទប់ក្លិបម្រះដោយថង់ រឺក្រដាសនៅពេលផ្កាក្លិបម្រះចាប់ផ្តើមស្រពោន។ កុំទុកក្លិបផ្ការហូតដល់ជ្រុះទើបច្រកថង់ រឺក្រដាស។ ត្រូវបេះផ្លែដែលខូចៗហើយកប់ផ្លែទាំងនេះចោល។ បើទុកផ្លែដែលខូចនៅក្នុងចំការ រឺចោលក្បែរចំការ នោះកូនដង្កូវ

ដែលញាស់ចេញមកក្លាយជាមួយចោះផ្លែកាន់តែច្រើនឡើងហើយបំផ្លាញកាន់តែខ្លាំងជាមុន។

**ការពារនិងការកំចាត់ជំងឺរឿងស្លឹក:**

ចាប់តាំងពីកូនម្រះដុះ ត្រូវបាញ់ថ្នាំផ្សិត៥ថ្ងៃម្តងនៅរដូវភ្លៀង និង៧ថ្ងៃម្តងនៅរដូវប្រាំង។ បាញ់ថ្នាំផ្សិតនៅម៉ោង៤ទៅម៉ោង៥ល្ងាច។ ដោយសារផ្សិតជំងឺនៅខាងក្រោមស្លឹក យើងត្រូវ

បាញ់ថ្នាំពីខាងក្រោមស្លឹកទៅខាងលើ។ បើម្រះមានជំងឺផ្សិតហើយយើងត្រូវកាត់ស្លឹកទាំងនេះចេញសិនមុន និងបាញ់ថ្នាំផ្សិត។ ស្លឹកនេះយកទៅកប់ចោល រឺធ្វើជាជីកុំប៉ុស្តបាន។ កុំទុកស្លឹកនេះនៅក្នុងចំការ វាឆ្លងទៅដើមផ្សេងទៀត។ កុំប្រើថ្នាំឈ្នោះកុំបាត់សត្វល្អិតនិងជំងឺដីដែលៗ វាធ្វើអោយសត្វល្អិតនិងជំងឺមានភាពធន់ទ្រាំជាមួយថ្នាំ ពិបាកកំចាត់នៅពេលក្រោយ។ កុំប្រើថ្នាំពុលលាយចូលគ្នានៅពេលបាញ់ វាធ្វើអោយថ្នាំគ្មានប្រសិទ្ធិភាព ហើយសត្វល្អិត ដង្កូវរហ័សសំនិងថ្នាំ ពិបាកកំចាត់លើក្រោយ។ កុំដាំម្រះលើដីដីដែលៗនាំអោយកើតមានជំងឺ និងសត្វល្អិតកាន់តែច្រើនជាហេតុពិបាកកំចាត់វា។ សូមដកម្រះយកទៅដុតចោលក្លាមបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ប្រមូលផលហើយ។ កុំទុកដើមដែលឈប់ប្រមូលផលហើយនៅនឹងទ្រើងក្នុងចំការ។ ពីព្រោះវាជាជំរកសត្វល្អិតនិងជំងឺបំផ្លាញទៅដំណាំផ្សេងទៀតបាន។

**ការប្រមូលផល**

យើងអាចកាត់ផ្លែបាននៅពេលណាដែលវាមានពណ៌រលោងនិងក្រឡាប្រេះល្អ តែទំហំផ្លែអាស្រ័យតាមទីផ្សារ។ ត្រូវកាត់ផ្លែនៅពេលព្រឹក ហើយត្រូវទុកផ្លែនោះនៅក្នុងម្លប់បន្ទាប់ពីកាត់ហើយក្លាម ជៀសវាងផ្លែរហ័សស្ងួត ស្រកទំងន់។

**ឯកសារពិគ្រោះ:**

- សៀវភៅណែនាំអំពីបច្ចេកទេសដំណាំបន្លែ, ២០១១
- សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសកសិករ ផលិតកម្មដំណាំបន្លែ, ២០១៣



**ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

**ដំណាំម្រះ**



សហការផលិតដោយ  
នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម និងកម្មវិធី  
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ - ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

២០១៣