



សណ្តែកស្បៀង
(ពូជក្នុងស្រុក)



១.ការជ្រើសរើសទឹកផ្លែ:

- ដីមានជីជាតិ
- ដីធូរ និងរាបស្មើល្អ
- ដីខ្ពស់មិនលិចទឹក

២.ការជ្រើសរើសពូជសណ្តែកស្បៀង:


ក. ពូជនៅក្នុងស្រុក :

- ពូជសំបកផ្លែពណ៌ស B3039 មានរយៈពេល ៩៨ ថ្ងៃ
- ពូជសំបកផ្លែពណ៌ខ្មៅ ពូជក្នុងស្រុកមានរយៈពេល៩២ ថ្ងៃ
- ពូជស្រមូរ រយៈពេល ៩៥ថ្ងៃ
- ពូជស្តា រយៈពេល ៩៥ថ្ងៃ

ខ. ពូជក្រៅស្រុក :

- ពូជស្បៀងលោក (ថៃឡង់)
- ពូជស្រាល (DT84) រយៈពេល ៨១ ថ្ងៃ

ដែលប្រជាកសិករនិយមចូលចិត្ត ដាំភាគច្រើនជាងគេបាន
ផលច្រើន និង មានរយៈពេលខ្លី ។



គ. ការរៀបចំដីសំរាប់ដាំសណ្តែកស្បៀង

- ត្រូវភ្ជួរជំរៅពី ១៥-២៥សម ចំនួន ២ ដង រួច ហើយរាស់
បំបែក ដីឱ្យបានបែកល្អិតល្អន

- ភ្ជួរលើកទី១ ត្រូវទុកហាលដីពី ៧ - ១០ ថ្ងៃ ហើយរើស
យកស្មៅ និងសំរាមផ្សេងៗ ចេញឱ្យបានស្អាត

- សណ្តែកស្បៀងត្រូវការដីធូរ, មានជីជាតិល្អ, មិនបៀម
មិនជាំទឹក តែដំណាំសណ្តែកស្បៀងត្រូវការសំណើមដីវហូតដល់ពេល
ប្រមូលផល ។

ឃ. ការដាក់ជីទ្រាប់បាត

- ជីកំប៉ុស្ត (ជីធម្មជាតិ) ត្រូវប្រើពី ១០- ២០ តោនក្នុង
១ ហិកតា

- ដី ដេ- អា-ប៉េ ត្រូវប្រើ ១០០ គ.ក្រ ក្នុង ១ ហិកតា
-ដី ប៊ូតាស្សូមប្រើ ១០០ គ.ក្រ ក្នុង ១ ហិកតា ដីទាំងអស់
នេះត្រូវ ដាក់នៅពេលភ្ជួររាស់មុនដាំ និងត្រូវភ្ជួរច្របល់រាស់ឱ្យសព្វ
ទៅក្នុងដី ។

ង. ពេលវេលាដាំដុះ:

-ប្រទេសកម្ពុជាយើងសណ្តែកស្បៀងត្រូវបានគេកំណត់ ការ
ដាំដុះគឺចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែមិថុនារហូតដល់ចុងខែកក្កដាយ៉ាងយូររប់
ផុត ព្រោះរយៈពេលក្នុងខែកក្កដានេះ មានសន្សើមចុះពេលយប់គ្រាប់
សណ្តែកអាចរីកដុះបានក្រោយពេលដាំ និង ស្រោចទឹកបន្តិចបន្តួច
ហើយរយៈពេល ៤-៥ ថ្ងៃ ក្រោយមក ពន្លកសណ្តែកស្បៀង
ចាប់ផ្តើមដុះចេញជាពន្លកត្រួយ ។

ច.បច្ចេកទេសដាំ

- ត្រូវយកគ្រាប់ពូជទៅហាលថ្ងៃចំនួន ១ - ២ ម៉ោង ។

ធ្វើ ដូចនេះអាចឱ្យគ្រាប់សណ្តែកឆាប់ដុះបានលឿនពេលដាក់គ្រាប់ទៅក្នុងដី

- តាមក្បួនខ្នាតគេដាំពីជួរមួយ ទៅជួរមួយ ០.៤០ម ទៅ

០.៤៥ម

- ពីគុម្ពមួយ ទៅគុម្ពមួយ ០.២០ម ទៅ ០.៣០ម

- រណ្តៅនីមួយៗ យើងដាក់គ្រាប់ ២ - ៣ គ្រាប់ និងមាន ជំរៅ

៣ - ៤សម. រួចយកដីមីដូ ឬដីលាយជីកំប៉ុស្តលុប ឱ្យជិត ពីលើគ្រាប់សណ្តែក រួចយកដៃទះបន្ថែមស្រាលៗ ដើម្បីធ្វើ ឱ្យគ្រាប់សណ្តែកស្រូបយកសំណើមបានល្អ ។

- បច្ចុប្បន្ននេះកសិករមួយចំនួនបានដាំដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិលើចំការធំៗ ។

៣.ការថែទាំ និងដកវរលស់កូនដំណាំ:

- ត្រូវដកកូនវរលស់សណ្តែកចេញខ្លះៗក្នុងរយៈពេល ១០-១៥ ថ្ងៃ ក្រោយពេលដំណាំដុះ ។

- ក្នុងមួយរណ្តៅ ឬ មួយគុម្ព មានចំនួន ២ ដើម

- ក្រោយពេលដាំចំនួន ១២ - ១៧ ថ្ងៃ ជំរះស្មៅលើកទី ១

- ១០-១៥ ថ្ងៃ ក្រោយជំរះលើកទី១ ត្រូវសំអាតស្មៅ លើកទី២

៤.ការដាក់ដីបំប៉នលើដំណាំសណ្តែកសៀង

- យើងត្រូវប្រើដីបំប៉នបន្ថែមក្រោយពេលដាំ២០-២៥ ថ្ងៃ

- ត្រូវប្រើជីអ៊ុយរ៉េលើកទីមួយ ៤០-៧០គ.ក្រ ក្នុង ១ ហិកតា

- បន្ទាប់ពីបាច ឬ ដាក់ជីរួចយើងត្រូវពូនគល់សណ្តែក ដោយយកដីតាមចន្លោះរងធ្វើឱ្យបានខ្ពស់ដើម្បីបង្កើតជាប្រឡាយ សំរាប់បង្ការទឹកចូល ។ រយៈពេលក្រោយការដាំ៣០ថ្ងៃ សណ្តែកចាប់ផ្តើម

ចេញផ្កាផ្លែមួយៗ ហើយយើងត្រូវ ឧស្សាហកម្មដើរមើលតើមានអ្វីដែលដុះនៅលាយឡំជាមួយដំណាំ យើងត្រូវដកវាចេញឱ្យអស់ ដើម្បីឱ្យសណ្តែកលូតលាស់ ល្អ ។

- ពិនិត្យមើលសត្វល្អិតផ្សេងៗ ដែលមកស៊ីបំផ្លាញ ។ យើងគួរប្រើថ្នាំ អាហ្សូមីន (ម៉ូណូក្រូតូហ្គុស) ក្នុងកំរិតពី ២០-៣០ សេសេលាយទឹកចំនួន ១០លីត្រ ឬ ២ - ៣ សេសេ លាយទឹក ១ លីត្រ ។



៥.ការប្រមូលផលសណ្តែកសៀង:

- ក្រោយពេលសណ្តែកមានផ្លែចំណាស់ (ផ្លែស្រគាល) ស្លឹកសណ្តែក វាចាប់ផ្តើមជ្រុះចេញពីដើមម្តងមួយៗរហូតអស់ ពីដើម (៧០-៩០ភាគរយ) ទើបយើងអាចប្រមូលផលបាន

- ធ្វើការត្រួតពិនិត្យកាត់សំអាតស្មៅ វល្លិ បន្ទាត់អោយសើមផ្លែនិងទទួលបានផ្លែស្ងួតល្អដោយស្រួលច្រូតកាត់ដើមពេលប្រមូលផល

- កាត់ដើមសណ្តែកដាក់ជាជួរ ឬយើងអាចពូនជាន់ទុកធ្វើនៅពេលព្រឹកព្រលឹម ប្រសិនបើដើមនិងផ្លែស្ងួត ល្អពុំមានត្រូវភ្លៀងពីយប់

- ជៀសវាងការប្រមូលផលនៅពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំង វាអាចធ្វើឱ្យ សណ្តែក បែក សំបក គ្រាប់ នាំឱ្យទិន្នផលថយចុះ

- ប្រមូលផលទាំងដើម ទាំងផ្លែមកដាក់លើរាន ឬ កន្លែងដែលយើងបានត្រៀមទុកសំរាប់ហាល

- ការបោកបែនដោយប្រើម៉ាស៊ីនពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ ។

- ក្រោយពេលប្រមូលផលសណ្តែករួចហើយ យើងត្រូវយកកាកសំណល់ និងដើមសណ្តែកទៅបាចពង្រាយលើដីដើម្បីធ្វើជាជីធម្មជាតិ (ធ្វើជីកំប៉ុស្ត, ជីសរីរាង្គ) ដោយភ្ជួរលប់ ។

- យកគ្រាប់សណ្តែកហាលឱ្យស្ងួត រួចច្រកទុកក្នុងការងារឱ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ ។

- បើយើងទុកពូជសំរាប់ឆ្នាំក្រោយយើងត្រូវហាលថ្ងៃឱ្យស្ងួតល្អទ្វេដងឧស្សាហកម្មមើលក្រែងសត្វស៊ីសណ្តែក សំណើម ៩-១០% ។

- គ្រាប់សណ្តែកដែលបំរុងទុកធ្វើពូជ ពេលប្រមូលផលភ្លាមត្រូវហាលសំរួតជាបន្ទាន់ជៀសវាងទុកយូរវិលង២២៣ថ្ងៃនាំអោយដំណុះថយចុះ ។

