

១- ឈ្មោះ និង ការចាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទឈើ

ឈ្មោះក្នុងស្រុក : បេង  
ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ : *Azelia xylocarpa Craib*  
គ្រួសារ : *Caesalpinaceae*  
ចំណាត់ថ្នាក់ជាតិ : ឈើប្រណិត

២- ការរាយប៉ាយក្នុងធម្មជាតិ និង ទីកន្លែងដុះដាល

ប្រភេទឈើបេងត្រូវបានរកឃើញដុះនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ឡាវ ថៃ វៀតណាម និងភូមា ដើមបេងដុះនៅក្នុងតំបន់ព្រៃត្រូពិចបៃតងជានិច្ច ឬ ព្រៃឈ្លោះ។ ប្រភេទនេះដុះនៅលើដីវាលទំនាប ហើយមិនដែលប្រទះឃើញដើម បេងដុះនៅលើភ្នំដែលមានកំពស់លើសពី ៩០០ម ឡើយ។ ជាពិសេសដុះរាយប៉ាយ នៅតំបន់ដីរាបស្មើ ឬនៅលើដីវាលទាបនៃជ្រោះជ្រលងដងភ្នំខ្ពស់ជាតិទឹក។ ដើមបេងអាចដុះលូតលាស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានរយៈកំពស់ពី៥០០-៧០០ម និង ក្នុងតំបន់ដែលមានរបបទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពី១០០០-១៥០០ម.ម ក្នុងមួយឆ្នាំនៃ ព្រៃចំរុះប្រភេទ ហើយអាចធន់នឹងរដូវរាំងស្ងួត (រដូវប្រាំង) អូសបន្លាយពេលវែងពី ៥-៦ខែ និងសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រចាំឆ្នាំពី ២០-៣២អង្សាសេ និងសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា ១០អង្សាសេ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាឈើប្រភេទនេះរងនូវការគំរាម កំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងឈានទៅរកការបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារការ ធ្វើអាជីវកម្មឫសកំរិត។ ដើមបេងត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃប្រភេទឈើ ដែលរងគ្រោះថ្នាក់របស់អង្គការ IUCN (World List of Threatened Trees) ។

៣- ការប្រើប្រាស់

សាច់ឈើបេងមានពណ៌លឿងចាស់ ភ្លឺរលោង ប្រកបដោយក្រឡាឆ្មុតៗ យ៉ាងល្អ។ សាច់ឈើរឹងមាំ ហើយជាប់ប្រើបានយូរ។ សាច់ឈើត្រើមៗ មានក្រយ៉ៅ ច្បាស់ពេលដុសខាត់ភ្លឺរលោងល្អ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា បេងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា ឈើប្រណិត និងមានតំលៃខ្ពស់ ជាទូទៅត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ធ្វើ តុ ទូ គ្រឿងសង្ហារឹម រូបចំលាក់ផ្សេងៗ ជាឈើសំណង់ ធ្វើក្តារមឃូសសំរាប់អ្នកមាន។ ក្រមួនគ្រាប់បេងអាចយកធ្វើការសំរាប់មូរបានហើយ គ្រាប់បេងពេលនៅខ្លី កូទីឡើង វាមានជាតិខ្លាញ់ អាចបរិភោគបាន។ សំបកយកទៅធ្វើថ្នាំកំលាំង ឬ ថ្នាំ បរិភោគបាយបាន និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាថ្នាំ សំរាប់សម្លាប់ស្បែកសត្វ និងពេទ្យ

សត្វប្រើព្យាបាលជំងឺវិក្ក ឆ្មា។

ដើមបេងមានសក្តានុពលល្អសំរាប់ផលិតផលឈើហិប ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ ឈើបេងនៅមានកំរិត ដូច្នេះគួរមានការស្រាវជ្រាវលើសុវត្ថិភាព និងរៀបចំ ប្រភេទនេះបន្ថែមទៀត។ ដោយសារដើមបេងជាប្រភេទឈើផ្តល់ជាតិអាសូត ដល់ដី គេអាចដាំតាមបែបកសិ-រុក្ខកម្មដើម្បីកែប្រែគុណភាពដី។ កន្លងមក ការដាំត្រូវបានអនុវត្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូច ជាពិសេសច្រើនតែដាំសំរាប់គោលបំណង នៃការអភិរក្សពូជឈើប៉ុណ្ណោះ។ ឈើបេងមានសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់យ៉ាង ខ្ពស់មិនតុល្យភាពនឹងលទ្ធភាពព្រៃ ហើយការធ្វើអាជីវកម្មឫសកំរិត ជាហេតុនាំឱ្យ ធនធានសេនេទិចត្រូវរងនូវការបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

៤- លក្ខណៈរុក្ខសាស្ត្រ

- ដើម: ជាដើមឈើមានទំហំធំ មានកំពស់ពី ១០-២០ម ពេលខ្លះអាចមាន កំពស់ដល់ ៣០ម និងមានអង្កត់ផ្ចិតដល់ ១.៥ម ហើយពេលខ្លះអាចធំជាង ២ម ក៏មាន។ ដើមបេងច្រើនតែកោង និងបែកជាចំពាម ហើយជាញឹកញាប់ផ្តល់ទូរក ដែលមានគុណភាពដ៏ល្អប្រណិត។
- ស្លឹក: ស្លឹកមានទំហំធំទូលាយ ជាស្លឹកសមាសស្លាបតូ ដែលមានពី ៣-៥តូ និង មានរាងជាពងក្រពើ។ ស្លឹកនីមួយៗមានបណ្តោយ ៥-៩ស.ម និង ទទឹង ៤-៥ស.ម ហើយគ្មានរោមទេ។

៥- ការពិពណ៌នាអំពីផ្កា ផ្លែ

- ផ្កា: ផ្កាចេញពីខ្លែងមែកខាងចុងមានរោមព័ទ្ធជុំវិញស្លឹង។ ផ្កាតូចមានរាងជា ចង្កោម ឬកូរ (Panicles) ដោយមានកេសរឈ្មោលពី ៧-៨ មានបណ្តោយ អាចដល់ ៣ស.ម។
- ផ្លែ: ធំក្រាស់ហើយរឹង នៅពេលទុំវាមានពណ៌ត្នោតចាស់ ឬខ្មៅ។ សំបក ផ្លែរឹងដូចឈើ (woody pod) ដែលមានបណ្តោយ ១៥-២០ស.ម ទទឹង៧-៩ស.ម។ ផ្លែអាចស្ថិតនៅលើដើមឈើរយៈពេលយូរ មុនពេលសំបកផ្លែរលើក ឬចំហដើម្បី ជំរុះគ្រាប់។
- គ្រាប់: គ្រាប់បេងធំហើយរឹង រាងមូលទ្រវែង ពណ៌ខ្មៅភ្លឺរលោង ឬពណ៌ ត្នោតចាស់ មានវិជ្ជមានត្រឹមពី ១.៥-១.៨ស.ម សំបកគ្រាប់ក្រាស់មានក្រមួន គ្រាប់ធំ (aril) ដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងពន្លកឫស (radicle) ហើយមានពណ៌លឿងនៅ ពេលស្ងួត។ ក្នុងមួយគីឡូក្រាមមានពី ១១០-១៦០គ្រាប់។ គ្រាប់បេងដែល បេះពីខេត្តព្រះវិហារក្នុងមួយគីឡូក្រាមមានចំនួន ១០០គ្រាប់ ក្នុងនោះក្រមួន គ្រាប់មានទំងន់ ៤៥% គ្រាប់បេងមានសំណើមដំបូងមធ្យម ១០.៩%។



៦- រដូវចេញផ្កា ផ្លែ

រដូវចេញផ្ការបស់បេងគឺនៅក្នុងខែមីនា-មេសា ហើយផ្លែទុំនៅខែកញ្ញា- ធ្នូ។ បេងមានផ្កា ផ្លែ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែរយៈពេលផ្តល់ផ្កា ផ្លែច្រើនគឺមានរៀង រាល់ពីរ ឆ្នាំម្តង។

៧- ការប្រមូលគ្រាប់ពូជ

ផ្លែបេងទុំនៅពេលដែលសំបកផ្លែប្រពណ៌បៃតងទៅជាត្នោត ហើយ គ្រាប់ឡើងរឹង និងមានពណ៌ត្នោតចាស់។ ផ្លែបេងអាចប្រមូលផ្តុំតាមរយៈការ ឡើងបេះ ឬអង្រួនមែក។ គ្រាប់បេងដែលជ្រុះពីដើម អាចបិតនៅលើដីរយៈពេល រាប់ខែដោយគ្មានការខូចខាតដល់លទ្ធភាពដុះពន្លក។ បច្ចុប្បន្ន ដើមឈើពេញវ័យ ត្រូវរងនូវការធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដូច្នេះមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ ក្នុងការ ស្វែងរកដើមពេញវ័យសំរាប់ការប្រមូលគ្រាប់។

៨- លទ្ធកម្មគ្រាប់ពូជ និង បញ្ហាជំងឺ

បន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្លែ ត្រូវបានសំងួតដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ (ហាលថ្ងៃ) នៅលើក្រណាត់កៅស៊ូរហូតទាល់តែសំបកផ្លែទាំងនោះហារ ឬបើកចំហ។ គ្រាប់ ទាំងអស់អាចត្រូវបានគេយកចេញដោយការកញ្ជ្រោក ឬដោយវាយបោកផ្លែ ទាំងនោះនៅក្នុងបារ។ មានភាពមិនច្បាស់លាស់ថា តើចាំបាច់ត្រូវដកយកចេញ នូវក្រមួនគ្រាប់មុនពេលស្តុកទុកដៃឬទេ ដើម្បីចៀសវាងការបំផ្លាញដោយពពួក ផ្សិត។ ការយកចេញនូវក្រមួនគ្រាប់នឹងកាត់បន្ថយភាពសំពិលសំពោងប្រហែល



២២៦

*Azelia xylocarpa* Craib

គ្រាប់បណ្តុះក្នុងថ្នាល ត្រូវស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រមាណ២-៣ស.ម ហើយត្រូវរោយ  
ដីខ្សាច់ល្អិតៗគ្របពីលើអោយបានជិតមានកំរាស់ ០.៥-១ស.ម។ បន្ទាប់ពីសាប  
ប្រមាណ ៧-១០ ថ្ងៃ គ្រាប់ចាប់ផ្តើមដុះពន្លករហូតចេញស្លឹក ដែលអាចយកទៅ  
បណ្តុះនៅក្នុងថង់ផ្សេងទៀតដែលបានត្រៀមទុក។ កូនឈើត្រូវផ្សំនឹងពន្លឺថ្ងៃឱ្យ  
បាន ៥០% រយៈពេល ៦ខែ មុននឹងយកទៅដាំ។

**១០- ការផលិតកូនឈើ**

ការត្រៀមដីឱ្យបានល្អ ជាផ្នែកមួយអាចជួយធ្វើឱ្យកូនឈើលូតលាស់  
បានល្អ។ កូនឈើដែលត្រូវយកទៅដាំ គួរតែត្រូវបានបណ្តុះនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិច  
មានអាយុយ៉ាងតិច ៦ខែ ហើយមុននឹងយកកូនឈើទៅដាំត្រូវស្រោចទឹកឱ្យសើម  
ម្តងទៀត ដើម្បីឱ្យកូនឈើធន់នឹងកំដៅថ្ងៃបានយូរ។



**១១- ការដាំកូនឈើ**

រដូវភ្លៀងគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតសំរាប់យកកូនឈើទៅដាំ ដោយត្រូវដាំ  
ក្នុងគំរោងពីត្នា ៤ម x ៤ម ព្រោះវាផ្តល់ចន្លោះដីអាចដាំដំណាំអ្វីផ្សេងៗទៀតបាន  
ហើយចំការកូនឈើបែងទៅថ្ងៃអនាគតនឹងផ្តល់ផលឈើក្នុងបរិមាណ និងគុណ  
ភាពល្អ។

**១២- ឯកសារយោង**

- Joeker D., 2000. SEED LEAFLET No. 6, Danida Forest Seed Centre.
- Some Endangered Species of Cambodia. CTSP, 2001. (ឯកសារមិនទាន់បោះពុម្ព)

២៥-៤៥% ប៉ុន្តែការកាត់យកក្រមួនគ្រាប់ចេញត្រូវធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ បើ  
មិនដូច្នោះទេ អាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់ពន្លកបួស (radicle) និងនាំអោយគ្រាប់  
ខូច។ ប្រសិនបើស្តុកគ្រាប់ទុកទាំងក្រមួនគ្រាប់ ចាំបាច់ត្រូវហាលគ្រាប់ទាំងនោះ  
ឱ្យបានស្ងួតល្អ។ គ្រាប់បែងជាប្រភេទគ្រាប់ orthodox (គ្រាប់អាចរក្សាទុកបាន  
យូរ) ហើយអាចស្តុកទុកក្នុងកំរិតសំណើមពី៨-៩%។ តាមរបាយការណ៍ពី  
រឿងពោធិបញ្ជាក់ថា គ្រាប់បែងអាចរក្សាទុកបានរយៈពេលមួយឆ្នាំ ក្នុងបន្ទប់  
ដែលមានសីតុណ្ហភាពធម្មតា ហើយបើស្តុកគ្រាប់នៅកន្លែងត្រជាក់នៅសីតុណ្ហភាព  
៥-១០អង្សាសេ នោះអាចស្តុកបានរយៈពេលយូរ២-៣ឆ្នាំ។ គ្រាប់បែងងាយទទួល  
រងនូវការបំផ្លាញដោយពពួកសត្វល្អិត។

**៩- ការសាកបណ្តុះគ្រាប់ពូជ**

គ្រាប់បែងមានសំបករឹងណាស់ ហើយគ្រាប់ទៅបណ្តុះតែម្តង ធ្វើឱ្យការ  
ដុះនៃគ្រាប់មានការយឺតយ៉ាវ ខាតពេលវេលាច្រើន តែបើធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មគ្រាប់  
ដោយទឹកពុះ ដើម្បីដាស់ភាពសំរឹងនៃគ្រាប់អាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេ។  
ម្យ៉ាងទៀត ដោយសារក្រមួននៃគ្រាប់ធំ វាបានពន្យារពេលដុះពន្លក ដូច្នេះគួរ  
តែកាត់យកវាចេញដោយប្រើកាំបិតយ៉ាងមុត ឬឆាប ឬចាំងសំបកគ្រាប់បន្តិច  
ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើមិនឱ្យប៉ះពាល់ដល់ពន្លកបួស។ ប្រសិនបើសំបកគ្រាប់មិនត្រូវបានឆាប  
ឱ្យដាច់នៅពេលដែលយកក្រមួនគ្រាប់ចេញទេនោះ គួរតែឆាបនៅចុងម្ខាងទៀត  
នៃគ្រាប់។ បន្ទាប់ពីឆាបសំបកគ្រាប់រួច ត្រូវយកគ្រាប់ទៅត្រាំទឹករយៈពេល  
១២ម៉ោង មុនពេលសាបក្នុងថ្នាល ឬថង់សំរាប់បណ្តុះ ដែលបានត្រៀមទុករួច។



*Azelia xylocarpa* (Kurz) Craib  
កូនឈើ ៤៦៦  
Germ. date sup: 01-05-2002