

- ក្រណាត់កៅស៊ូ ឬ ស្លឹកកណ្តុប
- ក្រដាសវាស់ PH

២.២-វត្តមានតុដើម ចំបើងឬគល់ជញ្ជូរវែង

២.៣-ការថែទាំវត្តមានតុដើម

- ការថែទាំវត្តមានតុដើមទុក នេះជាការងារមួយ មានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ប្រជាកសិករដែលប្រកបមុខរបរនេះ ។
- ចំបើងត្រូវយកមករៀបគរជាស្នើមមុនពេលយកមកប្រើពេលប្រើត្រូវបកយកស្រទាប់ខាងលើចោល ។



ផ្សិតចំបើង

ផ្សិតចំបើងជាបន្លែសំខាន់សម្បូរជីវជាតិ សម្រាប់បង្កើនមុខម្ហូបអាហារ ធានាបាននូវសុខុមាលភាពមនុស្សយ៉ាងល្អប្រពៃ និងកម្លាំងមាំមួន ថែមទៀតជាពិសេសងាយស្រួលលក់ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារប្រជាកសិករ ។

១-ការជ្រើសរើសទីតាំងតុមីសាស្ត្រ

- ក្នុងបណ្តុះផ្សិតចំបើង ចាំបាច់យើងត្រូវជ្រើសរើសទីកន្លែងបណ្តុះផ្សិតចំបើងចាំបាច់យើងត្រូវជ្រើសរើសទីកន្លែងបណ្តុះឱ្យបាន ល្អ ដើម្បីឱ្យផ្សិតដុះលូតលាស់ និង ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់គឺ៖

- ដីស្ងួតមិនជាទឹក គ្មានសត្វល្អិតបំផ្លាញ
- មានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់នៅរដូវវស្សា
- នៅរដូវប្រាំងត្រូវមានម្លប់ឈើងាយស្រួលបណ្តុះផ្សិត
- រដូវប្រាំងការដាំដុះដំណាំផ្សិត ទទួលបាននូវការលូតលាស់ល្អ

២-ការជ្រើសរើសសម្ភារៈនិងវត្តមានតុដើម

២.១-សម្ភារៈ

ការបណ្តុះផ្សិតចំបើងចាំបាច់ត្រូវមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបណ្តុះផ្សិតដូចជា៖

- កាំបិត ពូថៅ ចបកាប់ កណ្តៀវ កន្រ្ត ។ល ។
- ប៉ោតចំពួយផ្កាឈូក - កំបោរវស់

វិញធ្វើរបៀបនេះទើបដីនោះ ពុំមានពពួកសត្វល្អិតឬពួកមេរោគផ្សេងៗរស់នៅបានវិធីនេះ ជា ការងារងាយបំផុតហើយពុំសូវអស់ប្រាក់ដែលយើងត្រូវចំណាយ ទៅលើថ្នាំពុល ។

- ប្រើកំបោររស់ជាប្រភេទកំបោរម្យ៉ាងសម្រាប់បំបាត់សត្វល្អិតទាំងនោះបានដែរ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់មនុស្សយើងផង ការប្រើម្សៅកំបោរនេះគេប្រើទៅលើដីផង និងនៅ ពេលលាយជ្រលក់ចំបើងផងការអនុវត្តដាំផ្សិតនេះគេត្រូវការកំបោររស់ជាចាំបាច់ណាស់ ។

៥- ការរៀបចំដីបណ្តុះផ្សិតចំបើង

- កាប់ដីឱ្យបានជម្រៅ ១០ស.ម - ២០ស.ម
- ហាលដី ២-៣ ថ្ងៃ បំបែកដីឱ្យតូចៗល្មម
- នៅរដូវវស្សាយើងគួរលើករងឱ្យបានកម្ពស់ ១៥ស.ម - ២០ស.ម ។



- ឥទ្ធិពលលើការបណ្តុះផ្សិតចំបើង

- គេបណ្តុះផ្សិតចំបើងនៅកណ្តាលវាលឬម្លប់ក៏បាន ដោយយោងទៅតាមការនិយម របស់អ្នកបណ្តុះ
- ចំពោះរដូវក្តៅគួរបណ្តុះក្នុងទីម្លប់ឬធ្វើដំបូលក៏បាន
- ការរៀបចំដីសម្រាប់បណ្តុះវាជាការងារសំខាន់ ព្រោះផ្សិតដុះដោយសារដីមានជី ជាតិ ៣០ភាគរយ និង ដុះពីចំបើង៦០ភាគរយ
- ចំពោះរដូវក្តៅផ្សិតដុះដោយសារដីកាន់តែច្រើនឡើង ព្រោះដីបានផ្ទុកអាហារផ្សេងៗសម្រាប់ផ្តល់ឱ្យផ្សិត ។

៤- ការកំចាត់សត្វល្អិតនៅក្នុងដី

- ការកំចាត់ពួកសត្វល្អិត គឺ កំចាត់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសសាមញ្ញឬទៅតាម លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទំនើប ។

៤.១- ពពួកសត្វល្អិតក្នុងដីមាន

- ស្រមោច កណ្តៀវ ជន្លេន ដង្កូវដូង

៤.២- វិធានការកំចាត់ និងការពារ

វិធានការនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកៗគ្នាទៅតាមបច្ចេកទេសដូចជា៖

- ចំពោះដីណាដែលត្រូវការដាំដំណាំផ្សិតគេត្រូវមានវិធីការពារដីនោះកុំឱ្យមានសត្វល្អិត រស់នៅ ឬមានមេរោគ ដូច្នេះចំបាច់ត្រូវការ ពារដីនោះ កុំឱ្យមានសត្វល្អិតរស់នៅ ឬមានមេ រោគ ដូច្នេះចំបាច់ត្រូវការពារជាមុន មុននឹងដាំផ្សិតចំបើងគេត្រូវភ្ជួរដីនោះហាលពី ២-៣ ថ្ងៃ ហើយបញ្ចូលទឹក ៣-៤ ថ្ងៃ ទើបបង្ហូរទឹកចេញ

ដំណាក់កាលទី ២

- យកចំបើងឬគល់ជញ្ជាំងដែលបានសម្រាំងទុកជ្រលក់ទឹកឱ្យជោគល្អដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល ៦ - ១២ម៉ោង រួចស្រង់ចេញពីទឹកយកមកតម្រៀបដោយផ្ទុយគ្នាដាក់ក្បាលកណ្តាប់ចេញក្រៅ ។
- ពេលយើងរៀបមួយស្រទាប់ ហើយត្រូវស្រោចទឹកបណ្តើរជាន់បណ្តើរឱ្យហាប់
- យកមេឃ្លិតដែលបានសម្រាំងទុកឈឺអោយម៉ដ្ឋយកមករោយតាមបណ្តោយរងដោយឃ្នាតចេញពីគល់កណ្តាប់ពី ៥ស.ម - ៧ស. ម (ត្រូវប្រើមេឃ្លិត២ កញ្ចប់ លើរងមាន បណ្តោយ ៥ ម) ។
- បន្ទាប់មករោយអាហារបន្ថែមពីលើមេឃ្លិតទៀត អាហារបន្ថែមនោះប្រើ ១ម២ = ១ គីឡូក្រាម (ស្លុត និង រាយល្អ ដែលត្រៀមទុកមួយសប្តាហ៍មុន) ។



៦- ទឹកដែលត្រូវប្រើក្នុងការបណ្តុះឃ្លិតចំបើង

- ជាទូទៅទឹកដែលត្រូវប្រើស្រោចបន្ថែមបានក៏អាចស្រោចឃ្លិតបានដែរ ដូចជាប្រឡាយ ផ្ទុក ត្រពាំង បឹង អូ ជាដើម ជៀសវាង ប្រើទឹកអណ្តូងដែលមានជាតិរ៉ែផ្សេងៗដែលនាំឱ្យឃ្លិតដុះលូតលាស់មិនបានល្អ ។

៧- ការជ្រើសរើសមេឃ្លិតចំបើង

- មេឃ្លិតដែលល្អមានក្តិនក្រអូបដូចឃ្លិតចំបើងពីតូច
- ថង់មេឃ្លិតជាប់លាប់ល្អមិនរំហែក
- ថង់មេឃ្លិតមានដុះសរសៃៗ ដូចសរសៃអំបោះ

៨- របៀបរៀបរងបណ្តុះឃ្លិតចំបើង

ដំណាក់កាលទី ១

- ទទឹងរង ០.៦០ ម៉ែត្រ ទៅ ០.៧០ ម៉ែត្រ
- ចន្លោះរងសម្រាប់ដើរថែទាំនឹងស្រោចទឹកពី០,៥០ម-០,៧០ម
- បោះបង្គោលក្បាលនៅសងខាងរងដើម្បីទប់ចំបើង



- ក្រោយពេលរៀបចំសព្វគ្រប់ត្រូវទុកចោលរយៈពេល ២-៣ថ្ងៃដោយគិតពីថ្ងៃចាប់ផ្តើម

៩-របៀបគ្របដំបូងដុត

- បន្ទាប់ពីបានទុកចោលក្នុងរយៈពេល ២-៣ថ្ងៃមក នៅថ្ងៃទី ៣ យើងត្រូវយកចំបើងស្លូតមកជុះគ្របពីលើផ្ទៃរង ទាំងមូលឱ្យសព្វ កន្លែងកម្រាស់ពី ៥ស.ម-៧ស.ម រួចចាប់ផ្តើមដុតពីក្រោមខ្យល់ (ដុតចំនួន ៣ កន្លែងក្នុង ១ រង) គឺក្បាលរងកណ្តាល និងចុងរងដុតរួចត្រូវទុកចោលរយៈពេល ១ ថ្ងៃ ។

ថ្ងៃបន្ទាប់បោសផ្ទះចេញអោយស្អាត ប្រសិនបើកន្លែងខ្លះមានផេះក្រាស់ពេកត្រូវបោសអោយស្មើសព្វរង ។ បន្ទាប់ពីបោសផ្ទះរួចទុក ចោលមួយថ្ងៃទៀត នៅថ្ងៃបន្ទាប់ស្រោចទឹកជាន់ឱ្យហាប់ដោយប្រើកំបោររស់ចំនួន ០.៥ គីឡូក្រាម ជាមួយទឹក១០០ លីត្រស្រោចពីលើរងយកជីអ៊ុយរ៉េ ០,១០ក្រូ លាយទឹក១០ប៉ោតផ្តាណូកហើយស្រោចទឹកធម្មតាបន្ថែមទៀត ។



ដំណាក់កាលទី ៣

- បន្ទាប់ពីរោយមេផ្សិតហើយ យើងយកចំបើងជ្រលក់ទឹកអោយជោគរួចយកទៅតម្រៀបពីលើធ្វើសកម្មភាពដូចសើទីមួយដែរ ត្រូវបន្ថយក្បាលកណ្តាប់ចូលទៅក្នុងបន្តិចប្រមាណពី ៥ស.ម ទៅ ៧ស.ម នៅសង្វាងរងជុំវិញ (រក្សាកម្ពស់ដំដេល) ។

- ការជាន់និងស្រោចទឹកធ្វើតាមលក្ខណៈដូចខាងលើ ក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពរួចហើយត្រូវយកមេផ្សិតនិងអាហារបន្ថែមមករោយពីលើជាការបញ្ចប់នៅលើសើទី២ នៅសើទី២នេះត្រូវប្រើមេទ្វេជាពីរស្មើ ៤ កញ្ចប់លើរងប្រវែង ៥ ម ។

ដំណាក់កាលទី ៤

- ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយកចំបើងរៀបដូចនៅសើទី ១ និងទី ២ ដែរ ការបន្ថយក្បាលកណ្តាប់ធ្វើដូចនៅសើទី ២ ។

- ប៉ុន្តែនៅជាន់ទី ៣ ជៀសវាងការដាក់ចំបើងក្រាស់ពេកនាំឱ្យផ្សិតដុះពុំរួច ។
- ការស្រោចទឹក និងជាន់បង្គាប់ធ្វើរបៀបដំដេលៗ ។
- រោយមេផ្សិតចំពីលើរងតែម្តង ទុកសង្វាងរងឱ្យសល់ ៥ស.ម (ប្រវែងបណ្តោយរង ៥ម = ៤កញ្ចប់)
- រោយមេផ្សិតរួចហើយត្រូវយកចំបើងមកតម្រៀបពីលើរងដោយដាក់បណ្តោយរងកម្រាស់ ៥ស.ម - ៧ស.ម ។

ក្នុងការផ្សំចំណីយើងត្រូវប្រើវត្ថុធាតុដើមដូចខាងក្រោម៖

របៀបទី ១

- អាចម៍សេះស្លូត ២០ គក្រ ច្របាច់ហាលឱ្យស្ងួត
- អាចម៍គោស្លូត ៣០ គក្រ ច្របាច់ហាលឱ្យស្ងួត
- កំប្លោកស្លូត ១២ គក្រ ចិញ្ច្រាំឱ្យម៉ដ្ឋហាលឱ្យស្ងួត
- ដើមថ្នាំជក់ស្លូត ១០ គក្រ ចិញ្ច្រាំឱ្យម៉ដ្ឋហាលឱ្យស្ងួត
- សំបកផ្លែឈូក ១៥ គក្រ ចិញ្ច្រាំឱ្យម៉ដ្ឋហាលឱ្យស្ងួត
- ស្នួលផ្លែពោតទុំស្លូត ៥ គក្រ បុកឱ្យម៉ដ្ឋហាលឱ្យស្ងួត

ការផ្គាប់

- យើងត្រូវយកវត្ថុធាតុដើមខាងលើដោយច្របល់ចូលគ្នាអោយសព្វហើយគ្របទុករយៈពេល ៧-១៥ ថ្ងៃ មុននឹងយកទៅប្រើប្រាស់ បាន ។

របៀបទី ២

- យើងយកអង្ករដំណើប ០.៥ គក្រ ត្រាំទឹករយៈពេល ២ម៉ោងហើយស្រង់ហាលឱ្យស្ងួតរួចបុកឬកិនឱ្យម៉ដ្ឋ ។
- មេដំបែរស្រា ១ ខាំ កិនឱ្យម៉ដ្ឋហើយលាយបញ្ចូលគ្នាជាម្សៅដំណើប ហើយច្របល់ជាមួយនឹងមេផ្សិត (វត្ថុធាតុនេះលាយជាមួយ នឹងមេផ្សិត ១២កញ្ចប់) ។

១១-ការថែទាំ

មាន ២ របៀប

- ជម្រុះចំបើងស្លូតគ្របពីលើរងឱ្យជិតកម្រាស់ ៧-១០ស.ម ការគ្របរងមាន

លក្ខណៈ ៤ យ៉ាង៖

- ១- គេយកចំបើងគាបដោយឬស្សីធ្វើដូចថែបសម្រាប់គ្រប
- ២- គេយកកណ្តាប់ដាក់ជាបញ្ឈររំផ្អកផ្ទះឱ្យជិតជុំវិញរង
- ៣- គេយកចំបើងជម្រុះរោយ រាយគ្របតែម្តង
- ៤- គេយកកោស្លិច្នាស់ស្លឹចពណ៌សស្រអាប់គ្របផ្ទាល់រងហើយគ្របថែម ពីលើ ។

១០-វិធីធ្វើជីកំប៉ុស្តសំរាប់ផ្គាប់អាហារផ្សិត

- ការផ្សំចំណីអាហារបំប៉ន ការផ្សំចំណីសំរាប់ជំនួយដល់ការបណ្តុះផ្សិតជាការងារចាំបាច់សំរាប់ធ្វើអោយកើនទិន្នផលជាងការដែល មិនដាក់ជីកំប៉ុស្តី ។
- យើងអាចលែលកផ្សំចំណីដោយខ្លួនយើងបាន ពីព្រោះនៅក្នុងស្រុកយើងវត្ថុធាតុទាំងនេះងាយនឹងរក ។





ការស្រោចទឹកនេះយើងត្រូវពិនិត្យសំណើមក្នុងរងឆ្និតសិនបើក្នុងរងឆ្និតមានសំណើមខ្ពស់ យើងត្រូវផ្អាកការស្រោចទឹក ។

១២-ការប្រមូលផល

- ផលិតកម្មឆ្និតត្រូវបានប្រមូលផលជាបន្តបន្ទាប់ភាគច្រើនអនុវត្តនៅពេលព្រឹកមុនម៉ោង ៨ ពេលបេះឆ្និតត្រូវគ្របចំបើងពីលើរងវាដើម្បីឱ្យឆ្និតលូតលាស់ ផ្តល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ។
- គួរប្រមូលផលឆ្និតក្នុងលក្ខណៈដែលឆ្និតនៅក្រពុំល្អមានក្បាលស្រួចមុនពេលក្បាលឆ្និតដុះចេញពីស្រោម ។

កំណត់សំគាល់

ពេលព្រឹកស្រោចទឹកនៅម៉ោង ៨ បើស្រោចល្ងាចត្រូវស្រោចនៅម៉ោង ៥ ពេលឆ្និតចេញបិទពន្លក (ដូចពងត្រី) ត្រូវយកចំបើងពីលើរងចេញខ្លះ ដើម្បីបន្ថយសីតុណ្ហភាពដែលអាចអោយឆ្និតធ្វើការដុះលូតលាស់បានល្អ ។ នៅពេលចាប់ផ្តើមប្រមូលផលមិនត្រូវស្រោចទឹកច្រើនពេកទេ នាំឱ្យឆ្និតខូច ឬ រលួយ ។

របៀបទី ១

បន្ទាប់ពីស្រោចទឹក ជាន់ឱ្យហាប់ ដុតរួចគ្របចំបើងស្ងួតយកកៅស៊ូប្លាស់ស្ទិចពណ៌សគ្របលើរងឆ្និត ហើយគ្របថែមពីលើទៀត ធ្វើ ដូចដំបូលទូកគិតពីរៀបមកបាន ៩ ថ្ងៃ យើងមើលឃើញនូវសរសៃប្រទាក់គ្នាពណ៌សប្រផេះដូចសម្បុកពីងពាង ។ នៅពេលនេះយើង

ពិនិត្យមើលបើកន្លែងណាដែលមានសភាពស្ងួត ហើយនៅលើ ប្លាស្ទិចគ្មានព្រិកព្រួញស្រោចទឹកលើរងដែលគ្មានព្រិកព្រួញ រួចគ្របកៅស៊ូវិញហើយបង្ហើបកៅស៊ូផ្នែកខាងក្រោមកម្ពស់ ៥ស.ម ដើម្បីអោយមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អពិនិត្យមើលឆ្និតជាប្រចាំ ប្រសិនបើនៅលើរងឆ្និតមានដូចពងត្រីពណ៌ សៗ ត្រូវបន្ថយការស្រោចទឹកព្រោះបើយើងស្រោចទឹកជ្រុលបណ្តាលឱ្យរលួយខូចកូនឆ្និត ។

របៀបទី ២

- យើងស្រោចទឹក មួយថ្ងៃម្តង តែប្រសិនបើយើងស្រោចទឹកនៅពេលព្រឹកគឺយើងស្រោចនៅពេលព្រឹករហូត បើសិនជាយើងស្រោច នៅពេលល្ងាច គឺត្រូវស្រោចល្ងាចជារៀងរហូតលុះដល់ពេលប្រមូលផល ការស្រោចនេះគឺស្រោចអោយស្មើដៃជៀសវាងស្រោចម្តងព្រឹកម្តង ល្ងាចនាំឱ្យសំណើមមិនមានភាពទៀងទាត់នៅក្នុងរងឆ្និត ។

- ដាក់ផ្សិតចូលក្នុងទឹកពុះរយៈពេល ៨ នាទីរួចយកចេញពីភ្លើង
- យកទៅចាក់ក្នុងពាង ឬក្រឡា ហើយគ្របឱ្យជិតល្អជៀសវាងកុំឱ្យប៉ះពន្លឺ
- ការធ្វើបែបនេះអាចទុកប្រើប្រាស់បាន៦ខែនៅពេលណាចង់ទទួលបានត្រូវបន្សាប

អំបិលជាមុនសិន ។

ជាទូទៅបងប្អូនប្រជាកសិករតែងតែយល់ថាការកែច្នៃផ្សិតនាំឱ្យអស់រសជាតិ ។ ជាការពិតណាស់វាក៏អាស្រ័យទៅលើគុណភាពនៃ ការកែច្នៃដែរ ។



ការប្រមូលផលផ្សិតចំបើង

១៣-ការកែច្នៃផលិតផលផ្សិត

របៀបកែច្នៃមាន ២ យ៉ាងដូចខាងក្រោម

១៣.១-ធ្វើផ្សិតស្ងួត

- លាងផ្សិតឱ្យស្អាត
- ត្រាំក្នុងទឹកអំបិលដែលកំពុងពុះរយៈពេល៣-៤ នាទី
- ស្រង់ឡើងហើយច្រោះ និងដាក់ហាលថ្ងៃឱ្យផ្សិតស្ងួតល្អ
- ទុកនៅកន្លែងស្អាត ដោយគ្របការពារពីស្រមោច និងសត្វល្អិត

១៣.២-ធ្វើជាផ្កុកផ្សិត

- លាងអោយស្អាត
- រៀបចំលាយទឹកអំបិលដោយផ្សំទឹក ១លីត្រ លាយអំបិល ៩០០ក្រាមរួចដាំឱ្យពុះ





ឯកសារយោង:

- ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយខេត្តកណ្តាល
- អង្គការ CRS ស្រុកអង្គស្នួល
- សាលាជាតិកសិកម្មព្រៃកលៀប
- បទពិសោធន៍របស់កសិករស្រុកស្អាង និងស្រុកអង្គស្នួល

ម្យ៉ាងទៀតការកែច្នៃរបៀបនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវជាតិឡើយ ផ្ទុយទៅវិញគឺទុកសម្រាប់ធ្វើជាអាហាររបស់បងប្អូនបរិភោគបានយូរ ប៉ុណ្ណោះ

កំណត់សំគាល់

- ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ: *Vovaria Escultenta*
- ឈ្មោះអង់គ្លេស: Straw Mushroom

