

ចំណាំប្រតិយ

ការព្យេតចំនួយ

- រៀបចំផែនទំហំ ១ម៉ែត្រ (ត្រូវមានកំពស់ ៣០ ស.ម យ៉ាងតិចនៅរដ្ឋីរិស្សា)
 - ព្រាយជីលាមកគោស្តុត្រឹមឱកបុស្តី និងជីកេងទេពញ ផែនកាប់ប្រចាំលំដាបូយជីឡូស្វែល
 - គ្រប់ផែនប៉ឺងឡូបានកំភស់យ៉ាងតិច ៥ ស.ម ប្រើគំរបដីផ្ទាស់ស្ទិកដើម្បីការពារស្វ័ចផ្ល និងរក្សាសំណើមជី។



ការបង្កើតរំលែក

ដើម្បីឲ្យបានកុនត្រប់ដែលមានសុខភាពណូយើងត្រូវ
ការកុនតាមរបៀបខាងក្រោម:

- រៀបចំកន្លាឃបណ្តុះ(ស្តីកត្រួតប្បស្តីកចេក)ប្រចាំសប្តាហ៍
 - យកដីមានដីជាតិ(ដីជូរក)១ភាគ ដីកំបុងស្តីលាមក



ការបោះឆ្នែនប្រជាពលរដ្ឋ

- ត្រូវដោក់កូនត្រប់អោយត្រូវចំណុចនៅថ្ងៃចំណុនថ្ងៃ-ពាល់មុនដំឡើងមីនីអោយដើមរឹងមាំល្អ ហើយធ្វើនិងអាកាសជាតុខាងក្រោម
 - កូនត្រប់អាយុបាន ២៥-២៨ថ្ងៃ អាចយកទៅដំឡាន (អាស្រែយតាមការចំណាំកូន)
 - ស្រាប់ទីកកូនត្រប់អោយសីមនៅពេលព្រឹក ទីបយកកូនត្រប់ទៅដំឡានពេលថ្ងៃរស់ល
 - យកកូនចេញពីកន្លាង បុ ចាសបណ្តុះដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមិនត្រូវឲ្យដាក់បុសកូនត្រប់ទៀតឱ្យយក្រោះធ្វើអោយកូនត្រប់អន់បាននៅពេលដំឡាន
 - ត្រូវស្រាប់ទីកកូនត្រប់អោយបានត្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីដំឡើងហើយដាក់ពិសេសរាងពី ២-៣ អាចិត្យបន្ទាប់ពីដំឡើងហើយ

ភាគទី២

ត្រូវស្រាវចនាគ្រប់គ្រាន់នៅពេលព្រឹកដៃស
រាងស្រាវចនាគ្រប់គ្រឹងពេជ្យដើម្បីមធ្យុលនៅពេលថ្មីល្អប
រាជបាលអាជីវកម្មបញ្ហាដល់ ដីណាំបានបន្ទាប់ពីដំភូនបាន
ព-១៥ថ្ងៃ ត្រូវដោតយើទៅរដិលមានកំពស់ពាណិក ហើយ
ចងដើម្បីត្រូវនិងយើទៅរដិលម្បីទៅដើម្បីកាត់ស្ថិកដែល
នៅផ្ទៀកខាងក្រោមបច្ចុប្បន្នដើម្បីអាយុយខ្សោចចូលបានល្អ
អាចកាត់បន្ទយការកែវតសត្វលិត និងជី។

ការប្រើប្រាស់វិ (បើដាក់ជីត្រូវគ្រោមនឹក និងជំរាប់យកជីថាន)

ពេលវេលា	ប្រព័ន្ធសីហី	កំណត់ដែលត្រូវដាក់ជា
ដាក់ជាប្រាប់បាត	ដី អិន ប៉ែ កា (១៥. ១៥. ១៥)១៣ក្រាម(១ស្ទាប ប្រពាយ)/ដើម ដីលាមកសត្វ ០.៥គីឡូក្រាម/ដើម	ពង្រាយលើរដៃហើយកាប់ច្របល់និងដី
ការដំកូន	តែម្នយដើម ក្នុងម្នយរណ្ឌា	
២ខែទីក្សបន្ទាប់ដាំ	ដីអិុយិៗ ២.៥ ក្រាម (១ចុងស្ទាបប្រពាយ)/ដើម	កប់ដីភាក់ទេ ចំណាយពីគល់កន្លះគីក
៤ខែទីក្សបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉ែ កា (១៥. ១៥. ១៥)២.៥ ក្រាម (១ចុងស្ទាបប្រពាយ)/ដើម	កប់ដីភាក់ទេ ចំណាយពីគល់១គីក
៥ ខែទីក្សបន្ទាប់ដាំ	ដីបូតាស្សែម១.៥ ក្រាម(១ចុងស្ទាបប្រពាយ)/ដើម	កប់ដីភាក់ទេ ចំណាយពីគល់១គីក
៧ខែទីក្សបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉ែ កា (១៥. ១៥. ១៥)២.៥ ក្រាម (១ចុងស្ទាប ប្រពាយ)/ដើម	កប់ដីភាក់ទេ ចំណាយពីគល់១គីកកន្លះ
១១ខែទីក្សបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉ែ កា (១៥. ១៥. ១៥)២.៥ ក្រាម (១ចុងស្ទាប ប្រពាយ)/ដើម	កប់ដីភាក់ទេចំណាយពីគល់១គីកកន្លះ
១៥ខែទីក្សបន្ទាប់ដាំ	ដី អិន ប៉ែ កា (១៥. ១៥. ១៥)២.៥ ក្រាម (១ចុង ស្ទាបប្រពាយ)/ដើម	កប់ដីភាក់ទេចំណាយពីគល់១គីកកន្លះ
១៧ខែទីក្សបន្ទាប់ពីដាំ	បញ្ចប់ការប្រមូលផល	

សាខាអង់គ្លេស

ឧស្សាហ៍ពិនិត្យរកមើលនៅតាមត្រូយដំឡាតាំបែង ឬ
ត្រូយនោះស្ថិតស្របពាណិជ្ជកម្មមើលខាងក្រុងដំឡាតាំដី
នោះ វាអាចមានក្នុងដំឡាតាំ។

សិក្សាត្រូវកាត់ត្រួយ បុរីមគ្រប់ដែលមានជង្វើសី និងធ្វើ
ដែលមានជង្វើសីចេញជាបន្ទាន់។ យើងអាចកំពាតត្រូវ
ជង្វើនោះដោយ ញេចនិងដោរីអាយសត្វសីកំពាន។ មិន
ត្រូវទុកវាក្នុងចំការ បុរីក្រែរចំការទេ ពីត្រាឃឺជង្វើនោក្នុង


កំដាំត្រប់លើដីដែលវានាំកើតមានដីនឹងសត្វ
នូវការនៅតែប្រើន ជាបោគុពិបាកកំចាត់វា កំប្រើប្រាស់កំចាត់
បញ្ហាលិតនឹងដីឡើងដែលវា វាជើងអោយសត្វលិតនឹង
ដីដែលត្រាំជាមួយប្រើបាន ពិបាកកំចាត់នៅពេលរកាយ។ កំ
ប្រើប្រាស់ពុលិយចូលគ្នានៅពេលបាន វាជើងអោយប្រើបាន
បសិទ្ធភាព ហើយសត្វលិត ដួងឱ្យរាប់សស្ថានឹងប្រើបាន
ចាត់ វាទេលរកាយ។ ជាពិសេសកំប្រើប្រាស់ដែលមានវណ្ណ
ណុំក្រហម (សញ្ញាក្នាលខ្មៅ) វារគ្រោះប្រើកំ ដល់សុខ
ភាពខ្ើៅងិរាស់។ ឯកដើមត្រប់ចេញភាមបន្ទាបពីបញ្ហប់
បម្លូលដែលហើយ។ កំទុកដើមដែលយប់ប្រមូលដែលហើយ
នឹងក្នុងចំការ។ ពីច្រោះវាដាច់រកសត្វលិតនឹងដីដែលបំផ្តាញ
ដោយការដែងទៅតាម។

వార్షిక్ శ్వాసజీవ

កាត់ដើរនៅពេលត្រីក និងមិនត្រូវទុកដើរកាត់
កើយអាយត្រូវបើក្រុងទេ ។

សាស្ត្រិក្រាង

- សៀវភៅនាំអំពីបច្ចកទេសដំណាំបន្ទី, ២០១៩
សៀវភៅនាំបច្ចកទេសកសិករ ជុលិតកម្មដំណាំ
បន្ទី, ២០១៣



ନୀତିବିଜ୍ଞାନ

នាយកដ្ឋាននិងជ្រើសរើសនិទ្ទេ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស