

ដង្កូវស៊ីបណ្តាលស្ពៃក្តោប

កូនដង្កូវស៊ីត្រួយខ្លីចោះចូលទៅក្នុងបណ្តាល និងផ្នែកខាងក្រៅក្តោប។ ដង្កូវនេះបានបំផ្លាញត្រួយបណ្តាលនៃក្តោបបង្កឱ្យស្ពៃមិនអាចក្តោបបាន ។ សំបុករបស់វាស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃស្ពៃខាងក្នុង។

យើងត្រូវការការពារស្ពៃក្តោបបានយ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបានមួយខែបន្ទាប់ពីបានដាំកូនហើយ ។ ដោយសារដង្កូវនេះបំផ្លាញបណ្តាលស្ពៃក្តោបខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ ។



ដង្កូវស៊ីត្រួយស្ពៃក្តោប



ដង្កូវស៊ីចោះផ្ទៃស្លឹកខាងក្រៅ ហើយស៊ីរូងចូលក្នុងធ្វើឱ្យស្ពៃមិនអាចក្តោបបាន។ កញ្ចប់សំបុកពងរបស់វាងាយរកឃើញនៅលើផ្ទៃស្លឹកផ្នែកខាងក្រោមដើម។

ដង្កូវយោងទោង

កូនដង្កូវទើបនិងញាស់ វាចាប់ផ្តើមស៊ីបកយក ជាលិកាបៃតង ផ្នែកខាងក្រោមស្លឹកខ្លីៗ ដោយបន្ទុយទុកសរសៃស្លើងៗ ផ្នែកខាងលើ។ ដង្កូវនេះបញ្ចប់ការស៊ីរបស់វារហូតក្លាយជាឌីកឡើយ។



ដង្កូវចោះផ្លែប៉េងដោះ

ដង្កូវទើបញាស់តូចៗស៊ីជាលិកាស្លឹកខ្លីៗ ។ ឯដង្កូវពេញវ័យស៊ីដាច់ស្លឹកខ្លីៗបង្កើតបានជាប្រហោងរុនតូចធំ រួចចោះចូលទៅក្នុងផ្លែធ្វើឱ្យប៉េងប៉ោះស្កុយរលួយ ។ ចំពោះដង្កូវវ័យចំណាស់វាចាប់ផ្តើមស៊ីបំផ្លាញចំនុច លូតលាស់ដូចជា កញ្ចប់ផ្កា ផ្កា និងក្តឹប។

ការការពារដង្កូវនេះត្រូវកាត់មែកស្លឹកមួយចំនួនចោលដោយចំណារចងដើមឱ្យស្រឡះពីដី។ ការប្រើថ្នាំពុលកសិកម្មមានប្រសិទ្ធភាព គឺនៅពេលសត្វល្អិតទើបញាស់ (កូនដង្កូវ) និងបេះដង្កូវមានដង្កូវស៊ីចេញជាមុនសិន។



ដង្កូវចោះផ្លែ និង ដង្កូវស៊ីរូងដើមត្រប់

មេអំបៅតែងពងដាក់ផ្នែកខាងក្រោមស្លឹក លើផ្កា និងដើមជាភាយៗ ឬជាក្រុម។ ក្រោយមកពងវាញាស់ជាដង្កូវហើយចោះចូលក្នុងដើមផ្នែកខ្លីនៃត្រួយធ្វើឱ្យត្រួយ នៃដំណាំត្រប់ស្រពោនមិន អាចលូតលាស់បាន ឬចោះចូលក្នុងក្តឹបខ្លីៗ ធ្វើឱ្យផ្លែស្កុយរលួយ ។

ការការពារដង្កូវនេះត្រូវកាត់រំលោះមែក ស្លឹក ត្រួយ ផ្លែដែលមានដង្កូវស៊ីចោល និងសំអាតស្មៅ ព្រមទាំងប្រើថ្នាំពុលកសិកម្មនៅពេលសត្វល្អិតទើបញាស់(កូនដង្កូវ) ។



ដង្កូវស៊ីរូងកូនសណ្តែក

ដង្កូវបញ្ចេញសរសៃស្កុយត្រសម្រាប់មួកកញ្ចប់ផ្កាជាមួយនឹងស្លឹកដែលនៅក្បែរនោះ។ បន្ទាប់មកចោះចូលក្នុងផ្កា និងផ្លែ។ ដង្កូវនេះវាចូលចិត្តស៊ីផ្កា ធ្វើឱ្យផ្កាមិនលូតលាស់មិនចេញផ្លែទេ។ តែបើវាស៊ីក្នុងកូនសណ្តែកធ្វើឱ្យកូនសណ្តែកស្កុយដាច់ជាកំណាត់ ។

ការការពារ ត្រូវបេះកូនសណ្តែកដែលមានដង្កូវស៊ីហើយបំផ្លាញវាចោល និងប្រមូលដើមសណ្តែកបន្ទាប់ពីប្រមូលផលហើយដុតចោលដើម្បីការពារការកើនឡើងវិមាណដង្កូវជំនាន់ក្រោយ។



ដង្កូវហ្វូង

ដង្កូវហ្វូងស៊ីស្លឹក ដើមនឹងផ្លែរបស់បន្លែជាច្រើនប្រភេទ។ វាស៊ីស្លឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅ ដំណាក់កាលកូនបន្លែកំពុងលូតលាស់។ ដង្កូវចំណាស់វាស៊ីបំផ្លាញស្លឹកនៅពេលយប់។ នៅពេលថ្ងៃយើងអាចរកឃើញពួកវាលាក់ខ្លួនក្នុងចំនុចកណ្តាលនៃក្រោមស្លឹកឬនៅជុំវិញគល់ដំណាំ។ ការការពារត្រូវគ្របថ្នាលបណ្តុះកូនដំណាំដោយសំណាញ់ការពារសត្វល្អិតនិងបេះដង្កូវដោយដៃហើយព្យេចវាចោល។



វិធានការកំចាត់តាមវិធីដាំដុះ

- ប្រើសំណាញ់សត្វល្អិតដើម្បីគ្របការពារផ្ទាល់បណ្តុះកូនបន្លែ ។
- បណ្តុះកូនដំណាំឱ្យឆ្ងាយពីចំការកំពុងដាំបន្លែ ។
- បេះដង្កូវដោយដៃហើយព្យួរចោល ។
- បេះផ្លែដែលមានដង្កូវស៊ីយកទៅកប់ឱ្យបានជំរៅ ២០ ស.ម ។
- រដូវត្រជាក់ និងភ្លៀងត្រូវដាំឱ្យរម្ងិលជាងរដូវក្តៅ ។
- សំអាតសៅនៅក្នុងចំការ ។
- ដាំដំណាំឆ្លាស់ជៀសវាងដាំដំណាំដីដែលអាចកាត់បន្ថយ សត្វល្អិតមួយចំនួនដែលរស់នៅ ក្នុងដីសល់ពីរដូវមុន ។
- ប្រមូលកំទេចកំទីបន្ទាប់ពីប្រមូលផលហើយចេញពីចំការ ។

វិធានការគីមីប្រើសម្រាប់កំចាត់ពួកដង្កូវមេអំបៅ

- ដំណាំបន្លែយកផ្លែ (ម្ទេស ត្រប់ សណ្តែកកូរ ប៉េងប៉ោះ ត្រសក់) ដំណាំទាំងនេះត្រូវបាញ់នៅក្នុង ដំណាក់កាលលូតលាស់រហូតដល់ចេញផ្កា ។
- ការបាញ់ថ្នាំពុលកសិកម្ម គឺធ្វើឡើងពីក្រោមនិងលើស្លឹក

- ថ្នាំគីមីដែលអាចប្រើប្រាស់បានមានដូចជា:**
- បាក់ស៊ីលូស ស្បូរីនជៀនស៊ីស (Bacillus thuringiensis)
 - ថ្នាំបេតា ស៊ីហ្សូស្ត្រីន (Beta-cyfluthrin)
 - ថ្នាំក្លរីប៊ីហ្វូស (Chlorpirifos)
 - ថ្នាំស៊ីបេមេទ្រីន (Cypermethrin)
- ការកំចាត់តាមវិធានការគីមី** មានប្រសិទ្ធិភាព លុះត្រាតែអនុវត្តវិធានការកំចាត់ តាមវិធីដាំដុះជាមុនសិន ។

សូមអន្តរាគមន៍នៃយុទ្ធសាស្ត្រការពារ
ដើម្បីបានបន្ថែមវិភាគដោយសុវត្ថិភាព ការប្រមូលផល ត្រូវរងចាំយ៉ាងតិច ៧ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំ ។

សុវត្ថិភាពការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម
ត្រូវពាក់សម្ភារៈការពារ នៅពេលលាយថ្នាំ និង បាញ់ថ្នាំកសិកម្មដូចជា:

- ម៉ាស់ការពារផ្លូវដង្ហើម និង វ៉ែនតា
- ស្រោមដៃ ស្បែកជើងកវែង និង មួក
- អាវដៃវែង ខោជើងវែង (ជាការប្រសើរបើវាមិនជ្រាប ទឹកឡើតនោះ)

- ប្រការត្រួតចងចាំ**
- ជៀសវាងបាញ់ថ្នាំនៅពេលដែលមានឃ្នុំកំពុងហើរក្នុងចំការ
 - មិនត្រូវលាយ និងបាញ់ថ្នាំនៅពេលមានខ្យល់
 - ជៀសវាងបាញ់ថ្នាំ ឬសំអាតផុងបាញ់ថ្នាំនៅក្បែរប្រភពទឹក
 - ត្រូវងូតទឹកជំរះដោយប្រើសាប៊ូក្រោយពេលលាយ និងបាញ់ថ្នាំកសិកម្ម

- រក្សាទុកថ្នាំកសិកម្មនៅកន្លែងស្ងួតត្រជាក់ល្អ និងបិទ ជិតមិនប៉ះពន្លឺថ្ងៃ និងភ្លើង
- រក្សាទុកថ្នាំកសិកម្មនៅក្នុងដប ឬ កញ្ចប់ដើមរបស់វានៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ផុតពីដៃក្មេង
- ដុត ឬកប់សំបកដប កញ្ចប់ថ្នាំ ដែលប្រើអស់នៅកន្លែងដែលឆ្ងាយពីប្រភពទឹក
- កុំប្រើប្រាស់សំបកដប កំប៉ុង ប៊ីដុងថ្នាំកសិកម្ម ឬ ឱ្យក្មេងលេងបន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំអស់ ។



វិធានការកំចាត់ពួកដង្កូវមេអំបៅ







