



# ដំណាំឪឡឹក និង ល្ពៅ

## ការរៀបចំដី និង ការលើករង



ការភ្ជួររាស់ដី



វាស់វែងទីតាំងរង ទៅតាមប្រភេទដំណាំបានណែនាំ



លើករង



ការដាក់ដីសរីរាង្គ (ដីលាមកសត្វ) ទ្រាប់បាត

0,៣-០,៥ម ថ្លែងរង ជំរាលចុះ

កំពស់រង ដែលគ្របបង្ហាញស្លឹកគ្របដី



ការគ្របរង ដោយប្រើចំបើង ឬ បង្ហាញស្លឹកគ្របដី



ជ្រៀកឬស្លឹកដើម្បីខ្ចាស់បង្ហាញស្លឹកគ្របដី ឱ្យជាប់ជាយូរ



ខ្ចាស់ជម្រៀកឬស្លឹក នៅក្បាលរង តែម្តង ហើយលាតដុំបង្ហាញស្លឹកគ្របដី តាមបណ្តោយរង

ទាញបង្ហាញស្លឹកគ្របដី គ្របពីលើរង។ ទាញ បង្ហាញដោយសងខាង ឱ្យតឹងល្អម កុំឱ្យផ្ទៃ បង្ហាញស្លឹក ធ្លាក់។




រងគ្របបង្ហាញស្លឹកគ្របដី ក្រាលមិនបានត្រឹមត្រូវ (រូបខ្មៅ) និង ក្រាលបានត្រឹមត្រូវ (រូបស្តាំ)




កំណត់ទីតាំងចោរណ្តៅសំរាប់ដាំដំណាំ ចំងាយពីចោរណ្តៅមួយ ទៅចោរណ្តៅមួយទៀត គឺគ្រប់រយតាមមុខដំណាំ



ចោរណ្តៅដោយប្រើកំប៉ុងក្តៅ (ដាក់ធុងក្នុង កំប៉ុង)។ កំប៉ុងត្រូវចោរណ្តៅឱ្យត្រឹមត្រូវ តែម្តងលើៗ ដើម្បីឱ្យខ្យល់ចេញចូល នេះបានល្អ



បង្ហាញស្លឹកគ្របដី សម្រាប់ដំណាំឪឡឹក



បង្ហាញស្លឹកគ្របដី សម្រាប់ដំណាំល្ពៅ



ការគ្របគ្រងគ្រាប់ និង ការថែទាំកូនដំណាំ



លើងល្បាយដី (ដីស្រទាប់លើ ដីសរីរាង្គ និងឆេះអង្កាម) បណ្តុះកូន ឱ្យបានក្តៅ



ឆេះអង្កាម ៦ ភាគ ដីស្រទាប់លើ ២ ភាគ និង ជីកំប៉ុស្តិ៍ ១ ភាគ លាយរួចបល់ចូល គ្នាឱ្យបានសព្វល្អ



ផ្តាប់គ្រាប់ ដោយយកគ្រាប់ទៅពង្រាយក្នុងក្រណាត់ដក់សើមទឹក រួចផ្តាប់គ្រាប់ ដោយទុករយៈពេល ពី ១ ទៅ ២ ថ្ងៃ



ដាក់ចំនួន ១ គ្រាប់ក្នុង ១ រន្ធជាសបណ្តុះ



ក្រោយពេលបណ្តុះរួចត្រូវស្រោចទឹក បន្ទាប់មកយកចាសបណ្តុះ ដាក់ក្នុង រោងបណ្តុះ។



រោងបណ្តុះត្រូវមានសំណាញ់កាត់បន្ថយពន្លឺព្រះអាទិត្យ ការពារកុំឱ្យសត្វ ពាហនៈចូល ហើយមានសំណាញ់ការពារសត្វល្អិតបំផ្លាញកូនដំណាំ



កូនឪឡឹកអាចដាំបាន ចាប់ពីមានអាយុ ពី ៨ ទៅ ១០ ថ្ងៃ ។ មុននឹងដាំ គេត្រូវពង្រឹងកូនឪឡឹក ដោយដាក់វាឱ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃ រយៈពេល ពី ៣ ទៅ ៥ ថ្ងៃមុនពេលដាំ។



Source: <http://www.vic.gov.au/FA/Seedlings/seedlinginstructions.html>  
Source: <http://www.vic.gov.au/gardener/how-to-transplant-summer-squash/>

ការដាំកូនដំណាំ



យកម្រាមដៃព្រួញបាតចាសបណ្តុះឡើងលើ ហើយដៃម្ខាងទៀតដកយកកូនដោយច្នៃមៗ ដើម្បីកុំឱ្យដាច់ឫសកូន។



សង្កត់ដីច្នៃមៗជុំវិញគល់កូនដំណាំ ដើម្បីកុំឱ្យកូនដួល ។ ត្រូវដាំកូន នៅពេលល្ងាច។



ត្រូវគ្របដី ឬ ចំបើង ដើម្បីកាត់បន្ថយកំដៅ។



ការតាត់តែងមែក (ឪឡឹក)



កាត់(ក្រៀវ)ត្រួយដើមម នៅស្លឹក (ថ្នាំង) ទី ៥

កាត់ត្រួយកូនឪឡឹក នៅពេលវាមានស្លឹកទី ៤ ឬ ៥។ តែចំពោះដំណាំល្អៅ វិញ គេមិនត្រូវកាត់ (ក្រៀវ) ត្រួយវាទេ។

ការពាត់ ឬ គម្រប់គ្រួស




ពាត់ត្រួយឪឡឹក ឱ្យដើមឪឡឹក វាទៅរកចំណុលចន្លោះដង។ ធ្វើដូច្នោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណាំ ដូចជា មិនដើរជាន់ខ្លាំងឪឡឹក នៅពេលដើរស្រោចទឹក។





### ការដាក់ ដី



ដីទ្រាប់បាតះ ត្រូវដាក់ដីសមាស ៥ក្រាម ក្នុងមួយរណ្តៅ ។ ត្រូវដាក់មុនដំបូង រយៈពេល ពី៥ ទៅ ៧ថ្ងៃ ក្នុងជម្រៅ១០ សម (១តិក) រួចគ្របដីពីលើ ហើយ ស្រោចទឹក រៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់ពេលដាំកូន។

ប្រើលើ ឬ ឬស្សី ចោះរណ្តៅដាក់ដីបំប៉ន ដីបំប៉ន ដាក់ចម្ងាយ ១០ សម ពីគល់ (ពេលអាជុយបាន ពី៧ ទៅ២១ថ្ងៃ ក្រោយពីដាំ) និងនៅចម្ងាយ ២០ សម ពេលបានអាជុយលើស ពី ២១ថ្ងៃ (ដាក់ជំរុច ត្រូវគ្របដីឱ្យជិតរណ្តៅដី ដើម្បីការពារការលាក់ស្លឹក)។

ចោះរណ្តៅ ចម្ងាយ ១០ សម (១តិក) ពីគល់ដំណាំ ឬ ចោះទូទៅចន្លោះកណ្តាល គុម្ពដំណាំទាំងពីរ

### សត្វល្អិតចង្រៃ និង ជម្ងឺ

ដង្កូវកាត់ស្លឹក CUTWORM	ដង្កូវមូលស្លឹក LEAFFOLDER	ចៃ APHID	រុយស WHITEFLY
អណ្តើកមាស SQUASH BEETLE	ដង្កូវស៊ីញ៉េ LEAFMINER	ជម្ងឺទំលើងស្លឹក DOWNY MILDEW	ជម្ងឺអុចស្លឹក CERCOSPORA LEAF SPOT
ជម្ងឺចេញជ័រ GUMMY STEM BLIGHT	ជម្ងឺរលួយផ្លែ FRUIT ROT	ជម្ងឺញញឹកស្លឹករណ្តៅ SQUASH LEAF CURL VIRUS	ជម្ងឺវីសរុញស្លឹកប្រាក់ WATERMELON SILVER MOTTLE VIRUS
ជម្ងឺម៉ូសាអ៊ិកស្លឹកលឿង ZUCCHINI YELLOW MOSAIC VIRUS	ជម្ងឺអុចស្លឹករាងរង្វង់ PAPAYA RINGSPOT		

### ការប្រមូលផល

