

✓ ផ្លូវជាងជាន់ទំន់រៀង ២-៣ សម ចន្ទោះនៅ ០.៤ ម

និង ជំរូញ ២-៣ ស.ម ។



ការរៀបចំដីសម្រាប់ជាតិណាំចំណុះឈើសត្វ

៣.ការចំណាំនិងប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋ

ការព្រះគ្រាប់ ត្រូវរាយគ្រាប់ពួនតាមចង្វុរដាងវ
រូបលប់ដីម៉ែត្រិលី ។ ក្រោយពេលព្រះបាន ២-៣ ថ្ងៃមាន
បើមានភ្លៀងដីណុះលូ តែបើក្រោយពេលដំឡើ ៩-១០ ថ្ងៃ ត្រូវ
កែវិន្ទគ្រប់ស្រាមទីកួលបានសិកម្ម ។



ការសាបក្បន់: ត្រូវសាបក្បន់នៅលើច្នាលត្បូងដួងសំណាយរហូតដល់ក្នុងស្វ័យបានអាយុពី ២០-៤៥ ឆ្នាំ ទីបងកទេដោយទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកសិករច្បាប់ចិត្តជាកំដោយសាបក្បន់ ព្រោះវាគាយស្រួលក្នុងការថែទាំ និងអាជសាបបានមុនពេលក្រែងផ្ទាក់។

ភាគចំណាំ: ត្រូវតាមដានការលើតតាមសំរបស់ស្ថាបន
ហើងជោគជ័យ ដើម្បី ជាក់ដីហើនុមបន្ទាប់ពីដំឡើ ១៥ ថ្ងៃ
និងក្រោមពីការប្រចាំខែពេលដឹកស្ដីពី។

ការប្រចាំឆ្នាំ

នៅសិម្បង អាជកាតិឱ្យសត្វសុបានលើកទី ១ នៅពេលដែលរាយការណ៍ ៥០ ថ្ងៃ និង លើកទី ២ ក្រោយពីកាត់លើកទី ១ ចំនួន ៣០-៤៥ ថ្ងៃ ។ អាជលេខិឱ្យសត្វសុដោយខ្លួនវាក់បាន ។ កាត់ដើមកំពស់ពាណិជ្ជជូន ៩០ ស.ម ។

សោរសិម្បង មានការដុះលួតលាស់ឡើងវិញព្យាយាងនាំបែកស បន្ទាប់ពីយើងច្រេតកាត់រូច ដូចនេះយើងត្រូវច្រេតកាត់
ឱ្យបានពិភពលោក ហើយឯកជនបានដើរដឹងថាអ្នកបានដើរដឹងនៅក្នុង
មិនសរុបនានារសជាតិចំពោះទងជាបសរា។

ចំណាំ: មិនគ្នាដល់មីសត្វសុវត្ថិភ័ណ្ឌមួយមុខ ត្រូវ លាយជាមួយចំបើង បុចំណើដើរដឹងទេវត ថ្វីសវាងការរក្សាស ។

ឯកសារយោង:

ពេជ្យានេអនុវត្តន៍ប្រសិរីលើការងារសុខភាព និង ផលិតកម្មគោលឆ្លោះ

ACIAR និង CIAT សេវាវេភាគបច្ចេកវិជ្ជាស្ថានដើម្បីផលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
នៅកម្ពុជា

លេខ សុផល៖ (២០០៦) ដើម្បីស្តីការពុងអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយ
កសិករ



សាមុខក្រសួង

ជំនួយក្រឡាយ និង បន្ទុព្យាងនៃ

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାତ୍ରମାନ

Simung Grass



ເງື່ອນດີເວັບໄຊ: ກາງີຍາຜົນຍຸງງາງເປົ້າເກະສົມຜົນຕິກຳ ອີ້ນ
ບສຸຕາງຕາລ ເຄືອກຕ່າງສົມຜົນຕິກຳ ສີຫບສຸຕາງຕາລ

ភាសាខ្មែរ: ជួរសង្ការ ភូមិត្រា សង្កាត់សីងមានជើយ ខណ្ឌមានជើយ
ភាសាខ្មែរ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ពីមួនកសិករិត្សាមសត្វជាថែលបំណុល គឺផែងខ្សោយ
សេវា។ បច្ចុប្បន្នសត្វកើន និង ដៃដីជាដុះត្រូវបានព្យិក នាំឱ្យ
ជីវាលិចំណុះត្រួចយុទ្ធមួយ កសិករមិនអាចថែលឯសត្រដោយឡើសវិ
បានដូចមួនឡើតទេ កសិករភាពត្រឹមត្រូវចំណាយពេលវេលដីស្ថិ
រកចំណុះត្រូវ ពេលខ្លះមានការលើកខ្សោយកសិករបង្កើតិត្តការពេ
លិយចំនួនសត្វចិត្តម ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដីណាំ
ចំណុះត្រូវ គឺជាផែកជាមួយសាមញ្ញនិងសម្របមួយ
សម្រាប់កសិករ។

តើបីជាកំពង់ជិនត្រូវមិន ?

ជំណាក់ចំណិសត្វីគឺជាពាណិកស្សារ ពពួកលេបូមវា និង
ពពួករុកជាតិលេបូម ឬ ថ្មីព្រៃកដែលភេជ្ជកំចែក ស្រាយទឹក
ហើយស្សារថ្មីដោយ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាចំណិសត្វី។ ពពួកដែលកំ
ចំណិសត្វីអាមេរិក ភាគច្រើនត្រូវបានការចូលមកពីបរទេសហើយ
ដែលត្រូវបានផ្តល់ការតំបន់ រាយការណ៍ដោយមានការចូលរួម
ពីកសិករ អ្នកធ្វើព្រៃក និងអ្នកស្រារ ជារដ្ឋាភិបាលបទ
ពិសោធន៍គឺជាផ្លូវកន្លែះ លើលក្ខណៈរបស់ជំណាក់ចំណិសត្វី ដែល
សម្របសំរាប់ជាអ្នកតំបន់ត្រូវពិក និងកំចំណិសត្វីដែលវេលាកំ
ឱ្យកសិករដា គឺជាប្រភេទចំណិសដែលមានការងុះលួតលាស់លើវិន
ទិន្នន័យខ្លួន និង សម្របចេញនិងលក្ខណៈសញ្ញានឹងការសេ
ជាតិប្រឡងកម្មជានិង សំបុរឡានដោយសារជាតិចិត្តី។

គុណភ្លែងនៃតាមបរិច្ឆេទស្ថាបន្ទូល

- ✓ ផ្តល់ចំណើបន្ថែមសំវាប់សត្វពេញមួយផ្លូវ ដោយគ្រប់គ្រងការងាររបស់ខ្លួន

ក្បុមសាស្ត្រ ដី ជីវិជាតិរបស់ដី និង អាយុរបស់ស្អោ និងត្រូវ
បំបនជីវិទានពីកញ្ចប់ ។ ស្អោនេះអាចជានៅបាលគ្នា តើបាន
នៅក្នុងម្មប់បាន ។ តែមិនចូលចិត្តទិកជាតជាត់ពាកទេ ហើយក
មិនសម្របទៅនឹងតំបន់ដែលមានរដ្ឋវ្រប់វ្រង់នៃកំណែផែរ ។

ទិន្នន័យជាមធ្យមពី ៩៨ ទៅ ១៩០ តាន/ឆ្នាំ/ប.ត ។
ទិន្នន័យពួរ ៥០ គ.ក្រ/បិកតាត ។

សម្របទាំងសម្រាប់ការច្រព់ការតិន្នន័យ ស្ថិតិ ឬ
អាចឈ្មោះពាល់/រស់បាននៅលើដីដែលមានជីវិតធមធ្យម តែបី
ដំឡើលើដីមានជីវិតធមធ្យម នៅក្នុងភ្នំពេញ ។



ජයාරූප ප්‍රතිච්ඡත්වය

န.၂၁၆၃

- ✓ ត្រូវធ្វើសរុបដីមិនលិចទឹក បុ មិនជាតិកពេក
 - ✓ ភ្នែរដីឱ្យបានដោរ ភ្នែរ ២-៣ ដង មុនពេលជា ១៤ ថ្ងៃ
 - ✓ រាល់បំបែកដីឱ្យបានម៉ែត្រល្អ និង ផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យបានរបស់ (ងាយដំឡូង បំបែក ក្រោមទឹក)
 - ✓ សំអាតប្រសគល់ស្វៀម្រោចដែលមិនមែនសំអាតប្រសគល់