



## ពូជស្រូវធ្ងន់ "ដំណើបស្បែមង្គល"

ពូជស្រូវ "ដំណើបស្បែមង្គល" ជាពូជស្រូវដំណើបទី១ ដែលបានធ្វើការបញ្ចេញ និងផ្សព្វផ្សាយជូនកសិករប្រើប្រាស់ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាចុងឆ្នាំ២០១៣។ ពូជស្រូវ "ដំណើបស្បែមង្គល" ជាពូជស្រូវដែលបានសម្រិតសម្រាំងតាមបច្ចេកទេសរុក្ខជាតិស្រូវ ពីពូជស្រូវប្រពៃណីដែលបានប្រមូលយកមករក្សាទុកនៅក្នុងធនាគារពន្ធក្នុងវិទ្យាស្ថាន។

### លក្ខណៈពិសេសៗរបស់ពូជស្រូវដំណើបស្បែមង្គល

ពូជស្រូវ "ដំណើបស្បែមង្គល" ជាពូជស្រូវធ្ងន់ប្រកាន់រដូវ ចាប់ចេញផ្កាក្នុងអាទិត្យទី២ ខែវិច្ឆិកា អាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុ និងពេលវេលាដាំដុះ។ កម្ពស់ដើមរបស់ពូជស្រូវដំណើបស្បែមង្គល ប្រែប្រួលពី១៤០-១៦០ ស.ម និងចំនួនដើមបែកផ្តល់ផលគឺចាប់ពី៨-១០ ដើមក្នុងមួយគុម្ព អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទដី។ ចំនួនគ្រាប់ក្នុងមួយកូរមានចាប់ពី១០០-១២០គ្រាប់ និងមានប្រវែងកូរ២៦-៣០ ស.ម។ គ្រាប់ស្រូវ១០០ គ្រាប់មានទម្ងន់៣,៤ ក្រាម និងមានទិន្នផលជាមធ្យម៣,២ តោនក្នុង១ហិកតា។ អង្ករល្អនៃវេង មានប្រវែងគ្រាប់ជាមធ្យម៧,២ មីលីម៉ែត្រ បន្ទាត់ក្រាស់ជាមធ្យម២,១ មីលីម៉ែត្រ និងមានអាមីឡូស ១,៦ ភាគរយ។ ពូជស្រូវដំណើបស្បែមង្គល ធន់មធ្យមទៅនឹងរាំងស្ងួត និងធន់បានល្អនឹងទឹកជំនន់។

### វិធីសាស្ត្រដាំដុះ

សម្រាប់ស្រូវសន្លុង បរិមាណគ្រាប់ពូជដែលចាំបាច់គឺពី៣០-៤០ គីឡូក្រាម ក្នុងមួយហិកតា ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគ្រាប់ពូជសុទ្ធ និងមានសុខភាពល្អ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងទឹកបាន និងថែទាំបានល្អ បរិមាណគ្រាប់ពូជដែលត្រូវការក្នុងមួយហិកតា គឺពី ១៥-២០ គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីឲ្យសំណាបដុះលូតលាស់ធំធាត់ល្អ គេត្រូវសាបគ្រាប់ពូជ មួយគីឡូក្រាមលើផ្ទៃដីថ្នាល ១០ ម៉ែត្រការ៉េ។ ទីសំណាបត្រូវធ្វើនៅជិតប្រភពទឹក តែត្រូវឆ្ងាយពីម្លប់ព្រៃ ឬកន្លែងមានភ្លើងអគ្គីសនី ដើម្បីចៀសវាងការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតចង្រៃ។ ជាការល្អ គួរស្វែងសំណាបដែលមានអាយុ២៥-៣០ ថ្ងៃ ហើយក្នុងមួយគុម្ពចំនួន២-៣ ដើម។ សម្រាប់ស្រូវពង្រោះ បរិមាណគ្រាប់ពូជដែលចាំបាច់គឺពី៦០-៨០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតា។ គួររៀបចំដីឲ្យបានល្អ និងរាបស្មើមុនស្លុង ឬព្រោះ។ ការភ្ជួររាស់ គួរតែធ្វើឲ្យបាន២-៣ សារជាការល្អប្រសើរ។ ប្រសិនបើស្រែអាចបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកបានបន្ទាប់ពីស្លុង ឬព្រោះបាន២០ ថ្ងៃអាចបញ្ចេញទឹកឲ្យអស់ពីក្នុងស្រែ២-៤ ថ្ងៃរួចបញ្ចូលទឹកថ្មីវិញ។ ធ្វើរបៀបនេះ គឺដើម្បីធ្វើឲ្យស្រូវកាន់តែបែកគុម្ពល្អ។



**ការប្រើប្រាស់ដី**

ការប្រើប្រាស់ដីសមស្របតាមកម្រិតណែនាំ និងមិនបណ្តាលឲ្យមានការថយចុះគុណភាពឡើយ។ គួរដាក់ដី២-៣ ដងក្នុងមួយវដ្តជីវិតរបស់ស្រូវ។ បាចទ្រាប់បាតមុនពេលស្ងួងដោយប្រើដីធម្មជាតិពី៥ តោន (២០ រទេះ) ក្នុង១ ហិកតា និងរួមផ្សំជាមួយដីគីមីដូចមានក្នុងតារាង១។ បរិមាណដីបាចបំប៉នលើកទីមួយ និងលើកទីពីរ ត្រូវអនុលោមតាមតារាង១ ហើយពេលវេលានៃការបាច ត្រូវអនុលោមតាមតារាង២។

តារាង១

ក្រុមដី	ស្រូវធ្ងន់ (ស្រូវវស្សា)				
	បាចទ្រាប់បាតមុនស្ងួង ឬព្រោះ (គ.ក្រ/ហាត)			បំប៉នគុយអ៊ី (គ.ក្រ/ហាត)	
	គុយអ៊ី ៥៦-០-០	ដេ អា ប៊េ ១៤-៥៦-០	ប៊ូតាស្យូ ០-០-៦០	លើកទី ១	លើកទី ២
ដីព្រៃខ្មែរ	១០	២០	៥០	២០	១០
ដីប្រទះឡាង	១០	៥០	២៥	២៥	២៥
ដីបាកាន ឬអូររូង	២៥	២៥	២៥	៥០	២៥
ដីទួលសំពោង	២៥	៥០	០	២៥	២៥
ដីគោកគ្រប់	១០	៥០	៥០	៥០	៣៥
ដីកំពង់សៀម	៣០	០	០	៥០	៣០
ដីកៀនស្វាយ	ជាដីតាមមាត់ច្រាំងទន្លេ និងជម្រាលពីច្រាំងទន្លេសមស្របសម្រាប់ស្រូវស្រាល				
ដីក្រគរ	ជាដីលិចទឹករយៈពេលយូរ ដែលកសិករធ្វើស្រូវឡើងទឹក ឬប្រដេញទឹក				
ដីក្បាលពោធិ៍					



តារាង២

ពេលវេលាសាប	បំប៉នលើកទី ១	បំប៉នលើកទី ២
១-៣១ មិថុនា	៣០ ថ្ងៃក្រោយស្ងួង	៥-៩ កញ្ញា
១-១៥ កក្កដា	៣០ ថ្ងៃក្រោយស្ងួង	១០-១៥ កញ្ញា
១៦-៣០ កក្កដា	៣០ ថ្ងៃក្រោយស្ងួង	១៥-១៩ កញ្ញា

**ការប្រមូលផល**

- ត្រូវប្រមូលផលស្រូវនៅពេលគ្រាប់ទុំល្អ គឺនៅពេលដែលកូនស្រូវមានគ្រាប់ចាប់ពីពាក់កណ្តាលកូនឡើងទៅមានពណ៌លឿងទុំចាស់ និងគ្រាប់ពេញពាក់កណ្តាល កូនចុះក្រោមមានពណ៌លឿងទុំស្រាល ហើយគ្រាប់ស្តុកវិញមានពណ៌ស្លាបសេកចាស់។
- គេអាចហាលសម្ងួតស្រូវនៅលើកន្ទេល សំណាញ់មុង តង់កៅស៊ូ និងឈាសស៊ីម៉ង់ត៍ គឺមិនបណ្តាលឲ្យគុណភាពគ្រាប់ស្រូវ ឬគ្រាប់ស្រូវពូជខុសគ្នាឡើយ។ កម្រាស់គ្រាប់ស្រូវដែលសមស្របសម្រាប់ការហាលសម្ងួតគឺ២-៣ ស.ម ដែលកម្រាស់គ្រាប់ និងសភាពពន្លឺថ្ងៃគឺជា កត្តាចម្បងក្នុងការកំណត់រយៈពេលហាលនិងគុណភាពគ្រាប់ស្រូវ៖
  - ថ្ងៃស្រឡះល្អ ហាលតែ១ ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ ដោយកន្លះម៉ោងរីម្តង។
  - ថ្ងៃស្រឡះបង្ហូរ ហាលសម្ងួតរយៈពេល២ ថ្ងៃដោយ១ ម៉ោងរីម្តង។
  - ថ្ងៃមិនស្រឡះ គេត្រូវហាលរហូតដល់៣ ថ្ងៃដោយ២ ម៉ោងរីម្តង។
- គ្រាប់ពូជត្រូវច្រកទុកនៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកចងឲ្យជិត រួចដាក់ក្នុងបារមួយជាន់ទៀត ហើយទុកដាច់ដោយឡែកពីគ្រាប់ស្រូវចំណីនៅកន្លែងដែលស្ងួតល្អ និងគ្មានការបំផ្លាញពីសត្វកណ្តុរ មាន ទាជាដើម។ ត្រូវសរសេរឈ្មោះពូជ និងថ្ងៃខែច្រូតកាត់ដាក់នៅលើបារឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អ។
- ផលស្រូវដែលប្រមូលបាន ត្រូវទុកដាក់ក្នុងជង្រុកឲ្យបានល្អ ដោយការពារកុំឲ្យសត្វកណ្តុរ មាន ទាស៊ី និងមិនឲ្យទទឹក។

