

ជំងឺជំងឺពកស្បែក គោក្របី (LSD)

- ❖ កើតមានឡើងលើគោ និងក្របី តែប៉ុណ្ណោះ ។
- ❖ មិនឆ្លងទៅមនុស្សឡើយ ។
- ❖ ជំងឺកើតមានឡើងតាមរដូវកាលជាពិសេសនៅរដូវវស្សាដែលមានពពួកសត្វល្អិតច្រើន (ដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគ) ។
- ❖ បង្កឱ្យមានការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការចិញ្ចឹមគោក្របី ដោយសារការខូចស្បែក បញ្ហាបង្កកំណើត រលូត ការថយចុះទម្ងន់ បរិមាណទឹកដោះថយចុះខ្លាំង និងក្នុងករណីខ្លះ បណ្តាលឱ្យងាប់តែម្តង ។
- ❖ រាំងស្ទះក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម (លក់-ដូរ) និងការខាតបង់ដោយការអនុវត្តវិធានជីវសុវត្ថិភាព ។



គោឆ្លងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលឡើងដំបៅស្បែកច្រើនកន្លែង © BFSU/Tsviatko Alexandrov

ការចម្លងជំងឺ

- ❖ ភាគច្រើនឆ្លងតាមសត្វល្អិត ដូចជា មូស តាប៉ោម មាននៅក្នុងក្រោល ។
- ❖ តាមរយៈការនាំគោក្របីដែលមានជំងឺពីតំបន់ផ្សេង ។
- ❖ អាចឆ្លងតាមរយៈការស៊ីចំណីនិងដឹកទឹករួមគ្នា ទឹកដោះ ការបង្កាត់ពូជ ការព្យាបាល (បើមិនដូរម្តង) ឬការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ។

ភាពឆន់រមស់មេរោគ

- ❖ នៅ ៦៥°C រស់បាន ៣០ នាទី ក្នុងទឹករងនៅ ៤០°C រស់បាន ៦ ខែ នៅសីតុណ្ហភាព -៨០°C មេរោគអាចរស់នៅបានរហូត ១០ ឆ្នាំ ។
- ❖ មិនធននឹងជាតិអាស៊ីតប្រូប្លាសទេ ។ ឆាប់ងាប់នឹងទឹកសាប៊ូ និងសារធាតុសម្លាប់មេរោគដូចជា ផេណុល (២%) ហ្ស៊ីម៉ាលីន (១%) Virkon® (2%) quaternary ammonium compounds (0,៥%) សូដ្យូមអ៊ីប៉ូក្លរីត (២-៣%) ។


ភាពឆន់រមស់មេរោគ

- ❖ វីរុសមានភាពធន់ខ្លាំងនិងអាចរស់នៅបានយូរក្នុងបរិស្ថាន ។ រស់នៅក្នុងដុំពកស្បែករលួយបានរហូតដល់ ៣៣ ថ្ងៃ ឬយូរជាងនេះ ក្រុមវីរុសបាន ៣៥ ថ្ងៃ និងក្នុងស្បែកស្ងួតបានយ៉ាងតិច ១៨ ថ្ងៃ ។ វីរុសងាយងាប់ដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងសាប៊ូ ប៉ុន្តែវាអាចរស់នៅបានជាច្រើនខែក្នុងក្រោលដែលគ្មានពន្លឺចេញចូល ។

រោគសញ្ញា

រយៈពេលសំដីជំងឺមានរហូត ២៨ ថ្ងៃ ហើយនឹងបង្ហាញរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោម ៖

- ❖ ក្តៅខ្លួនខ្លាំង (ពី ៤០ ទៅ ៤១ °C) បាត់បង់ការស៊ីចំណី និងបរិមាណទឹកដោះថយចុះ ។
- ❖ មានដុំពកលើស្បែករាងមូល (រឹងបួន) ប្រវែងពី ១ ទៅ ៥ ស.ម. ជាធម្មតាដំណាក់កាលដំបូងឃើញមានលើក្បាល និងក ។ លក្ខណៈនេះពិបាកសម្គាល់ ចំពោះគោក្របីដែលមានរោមរឹង ដែលតម្រូវឱ្យយើងស្ទាបផ្ទាល់ ឬអាចមើលឃើញនៅពេលរោមសើម ។
- ❖ ចំនួនដុំពកនៅលើស្បែកប្រែប្រួលពីតិចទៅច្រើនទៅតាមស្ថានភាពជំងឺពីស្រាលទៅធ្ងន់ធ្ងរ ។
- ❖ ដុំពកអាចរាបទៅវិញទៅតាមការវិវត្តន៍នៃជំងឺហើយក្លាយជាក្រុមរនិងដំបៅជ្រៅនៅផ្នែកកណ្តាល ដែលទាក់ទាញពពួកសត្វល្អិតជាខ្លាំងដូចជា មូស និងរុយជាដើម ។
- ❖ ដំបៅមាត់និងច្រមុះ (ក្នុងនិងក្រៅ) និងបបូរមាត់ ។
- ❖ ហៀរទឹករងចេញពីភ្នែកនិងច្រមុះនិងហៀរទឹកមាត់ច្រើន ។
- ❖ ហើមកូនកណ្តុរ (ជាពិសេសនៅលើផ្នែកស្មា និងក្លៅ) ។
- ❖ សត្វខ្លះមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាទេតែផ្អែកមេរោគក្នុងឈាមដែលអាចចម្លងទៅសត្វផ្សេងទៀតតាមរយៈសត្វល្អិតខាំ ឬប៊ិត ។



រូបភាពបង្ហាញពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺដុំពកលើស្បែក គោ ក្របី

រោគវិនិច្ឆ័យ

- ❖ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបឋមនៅលើវាល ផ្អែកជាសំខាន់លើសញ្ញាគ្រុនក្តៅ និងការលេចចេញដុំពក ។
- ❖ ការធ្វើតេស្តបញ្ជាក់នៅមន្ទីរពិសោធន៍ជាការចាំបាច់ពីសំណាកមានដូចជាដំបៅស្បែក ក្រុមរ ឈាម (ដាក់ថ្នាំកុំឱ្យកក EDTA) ឬគំបាត់ទឹកមាត់ ។ ក្រុមរ ជាសំណាកដ៏ល្អដោយអាចដឹកជញ្ជូនមិនចាំបាច់ប្រើសារធាតុថែរក្សា ។



ការព្យាបាល

ជំងឺនេះបង្កដោយវីរុសហើយពុំមានថ្នាំអាចព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពទេ ។ ការព្យាបាលបំបាត់រោគសញ្ញាអាចជួយបានដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់និងរលាក រួមផ្សំជាមួយថ្នាំផ្សះផ្សើមកំបាត់ពួកបាក់តេរីដែលឆ្លងចូលតាមក្រោយ ។

ការចាក់វ៉ាក់សាំង

- ❖ វ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពអាចការពារបានបន្ទាប់ពីចាក់បាន ៣ សប្តាហ៍ ។
- ❖ គួរចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យគោក្របី នៅមុនពេលដែលហូងគោក្របីទាំងមូលឆ្លងជំងឺ ។
- ❖ អាចមានប្រតិកម្មតិចតួចក្រោយពេលចាក់រួចដូចជា ៖
 - ហើមនៅកន្លែងចាក់ តែមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះ និងអាចបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលពី ១ ទៅ ២ សប្តាហ៍ ។
 - គ្រុនក្តៅមួយរយៈពេលខ្លី ។
 - ក្នុងករណីកម្រ វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនអាចបណ្តាលឱ្យមានស្នាមកន្ទួលតូចនៅលើខ្លួន ឬដោះ តែអាចបាត់ទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លី ។



ជំងឺរលាកនៅចុងដោះ © BFSA/Tsviatko Alexandrov

ពិនិត្យនិងតាមដានគោក្របី និងរាយការណ៍ពី ករណីសង្ស័យ

- ❖ ត្រូវពិនិត្យនិងតាមដានគោក្របីជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលផ្ទះជំងឺ ឬ នៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃជំងឺ។
- ❖ ត្រូវរាយការណ៍អំពីករណីសង្ស័យណាមួយជាបន្ទាន់។
- ❖ ជូនដំណឹងដល់ទៅកសិករចិញ្ចឹមសត្វនៅតំបន់ជុំវិញសង្ស័យផ្ទះជំងឺ សត្វ ឬអ្នកដែលបានទិញ-លក់សត្វថ្មីៗដើម្បីឱ្យពួកគាត់ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានសត្វដែលបានទិញ-លក់ថ្មីៗទាំងនោះ។
- ❖ ត្រូវបញ្ឈប់ចរាចរសត្វគោក្របីជាបន្ទាន់ក្នុងករណីមានការសង្ស័យពី ជំងឺជំពកលើស្បែកគោក្របី។

តើត្រូវការការពារកន្លែងចិញ្ចឹមគោក្របីយ៉ាង ដូចម្តេច ?

- ❖ ការចាក់វ៉ាក់សាំង ៖ ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពី ចាក់បាន ៣ សប្តាហ៍។
- ❖ ទិញគោក្របីពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបានគ្មានជំងឺ។ សត្វនាំចូលថ្មី ត្រូវពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់មុនបម្រាស់ទី និងនៅពេលយកមកដល់កន្លែង ចិញ្ចឹម ហើយគួរធ្វើចត្តាឡីស័កយ៉ាងតិច២២ថ្ងៃ។ ក្នុងករណីមានផ្ទះ រន្ធនៃជំងឺនេះក្នុងតំបន់ មិនត្រូវលក់ ទិញ ឬនាំសត្វថ្មីចូលទេ។
- ❖ ប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់ ឬបណ្តាញសត្វល្អិត (មូស រុយ ដង្កែ...) ឱ្យបាន ទៀងទាត់ តាមរយៈការលាប បាញ់ ឬ ប្រើប្រាស់ថ្នាំនៅកន្លែង។
- ❖ សម្អាតកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វកុំឱ្យមានដក់ទឹក លាមក និងសម្រាមដើម្បី កាត់បន្ថយការកើតនៃពពួកមូស រុយ និងសត្វល្អិតផ្សេងៗ។
- ❖ កុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្សេងចូលក្នុងកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វ។ ក្នុងករណីចាំបាច់ ត្រូវគោរពតាមវិធានដីវស្ស័យភាពឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ រាល់ឃានជំនិះ ឧបករណ៍ សម្ភារៈ និងស្បែកជើងជាដើម ត្រូវលាងសម្អាតដោយទឹក សាប៊ូ ឬថ្នាំសម្លាប់មេរោគ។
- ❖ ត្រូវបំបែកសត្វឈឺចេញពីសត្វជា។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគួរសម្លាប់ សត្វ ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលជាលម្អិតទៅសត្វផ្សេងទៀត។

ក្នុងករណីមានការសង្ស័យដំបូងពីជំងឺស្បែក គោក្របីដែលមានរោគសញ្ញាដូចជា៖

- ✓ ជំពកតូច ឬធំនៅលើស្បែកដងខ្លួន កញ្ជឹងក ច្រមុះ ប្រដាប់ ភេទ និងកន្សោមដោះ។ល។ ជំពកនេះដំណាក់កាលបន្ទាប់ នឹងក្លាយជាជំពៅហើយមានក្រម។
- ✓ សត្វក្តៅខ្លួនរហូតដល់៤១ 0C

☞ សូមរាយការណ៍ជាបន្ទាន់តាមទំនាក់ទំនងដូចខាង ក្រោម ៖

- ការិយាល័យផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាលខេត្ត
- អគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ

• លោក ទុំ សុផ្លីកា	ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥២ ៥១៨
• លោក នូ រិទិកា	ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៤៨៣ ៥៧៨
• លោក សុខ ជាវ៉ូ	ទូរស័ព្ទ: ០៧៨ ៥៥៥ ៦៨៩
• លោក ធី មករា	ទូរស័ព្ទ: ០៩២ ៦០២ ៩៩៧
	០១០ ៩៧៨ ១៩២
	០៨៨ ៥០០ ០៧២៥


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំងឺស្បែកគោក្របីនៅទីនេះ៖

<http://www.fao.org/3/a-i7330e.pdf>



Food and Agriculture Organization of the United Nations

ជំងឺជំពក លើស្បែក (LSD)



សម្រាប់បសុពេទ្យ

“ការបកប្រែនិងបោះពុម្ពអត្ថបទនេះ អាចធ្វើទៅបានដោយ មានការគាំទ្រពីការិយាល័យជំនួយមនុស្សធម៌ នៃទីភ្នាក់ងារ សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិក្រោមកិច្ចសន្យា លេខ 720FDA201000029។ ទស្សនៈយោបល់ដែលលើកឡើងក្នុងឯកសារនេះ គឺជា ទស្សនៈយោបល់របស់អ្នកនិពន្ធ និងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងជាចាំបាច់ ពីទស្សនៈរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ អន្តរជាតិឡើយ។”